Mitteilungen

über eine

neue Berechnung des erdmagnetischen Potentials.

Von

Company of the first decimal properties of the same was the same of the

teaching the work of the state of the state

Adolf Schmidt

in Gotha.

Milding to the district state of the

gen nu lietti M

and a radia

neue Berechnung des erdmagnetischen Potentials.



Adolf Schmidt

more with the distributed and the complete and the state of the state

jeder physikischen Hypothese frein analytische Darstellung won der Ver-

tellung der erdangrietischen Areft auf der Erdeberlitiche zu geben, eine

Darstellang, sleren Gemaniekeit beliebig weit gemieben werden kann, da sie

der benutzten Reilieg abhanet. Mit der Lösung dieser rein muthematischen

Aufgabe ist ign alle weiteren Unterstolenngen, deren det ziel einval-

kulisone Erkhaumr der erdmagnetischen Erschemmeen ist, eine ansmelehende

enumber L reb nov but mobacommendent men der Austraumer

Im 12. Jahrgange der unter dem Titel "Aus dem Archiv der deutschen Seewarte" erscheinenden Publikation habe ich vor ungefähr 5 Jahren einige mathematische Entwickelungen zur allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus gegeben, um dadurch eine Verschärfung der bisher zur Untersuchung des magnetischen Zustandes der Erde angewandten Methode anzuregen und zugleich einige Vorarbeiten für die damit gestellten Aufgaben zu liefern. Um das Verständnis des Nachfolgenden nicht von einem Zurückgehen auf jene frühere Arbeit abhängig zu machen, sei es gestattet, ihren wesentlichen Inhalt in möglichster Kürze wiederzugeben.

Die bisherigen durch die Arbeiten von Gauss eingeleiteten Versuche, die Aeusserungen der erdmagnetischen Kraft durch einen analytischen Ausdruck darzustellen, weisen, trotzdem das Beobachtungsmaterial stetig an Umfang und Verlässlichkeit gewonnen hat, keine in entsprechendem Masse wachsende Annäherung an die Wirklichkeit auf. Die Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten sind selbst bei der neuesten Berechnung des erdmagnetischen Potentials durch Neumayer und Petersen nicht wesentlich kleiner als bei der ältesten, von Gauss selbst ausgeführten. Aber während sie bei dieser noch als eine Folge der Mangelhaftigkeit der empirischen Grundlage angesehen werden konnten, muss ihnen jetzt eine thatsächliche Bedeutung zugesprochen, und es muss ihre Ursache in einer Unvollkommenheit der Theorie gesucht werden, ein Schluss, den zuerst Herr Neumayer selbst aus seinen Untersuchungen gezogen hat. Eine Verbesserung der Theorie ist nun, abgesehen von der Weiterführung der Reihen, deren man sich zur Darstellung bedient, in zwei Richtungen möglich und erforderlich. Einerseits ist die Abweichung der Erde von der Kugelgestalt zu berücksichtigen; anderseits und vor allem müssen die beiden bisher festgehaltenen Voraussetzungen aufgegeben werden, dass die erdmagnetische Kraft ein Potential besitzt, und dass dieses seinen Ursprung ausschliesslich im Erdinnern hat.

Als erste und wichtigste Aufgabe ergiebt sich hiernach die, eine von jeder physikalischen Hypothese freie, analytische Darstellung von der Verteilung der erdmagnetischen Kraft auf der Erdoberfläche zu geben, eine Darstellung, deren Genauigkeit beliebig weit getrieben werden kann, da sie allein von der Sicherheit der Beobachtungsdaten und von der Ausdehnung der benutzten Reihen abhängt. Mit der Lösung dieser rein mathematischen Aufgabe ist für alle weiteren Untersuchungen, deren letztes Ziel die physikalische Erklärung der erdmagnetischen Erscheinungen ist, eine ausreichende und zugleich die genaueste und bequemste Grundlage geschaffen. Von ihr aus kann zunächst die Frage entschieden werden, ob die ganze an der Erdoberfläche wirksame Kraft ein Potential besitzt oder inwieweit dies nicht der Fall ist, und es kann weiter, wenn ein Potential aufgefunden wird, derjenige Teil, der seinen Ursprung ausserhalb der Erde hat, von dem gesondert werden, dessen Ursachen im Innern derselben zu suchen sind.

Die Abplattung der Erde lässt sich mit geringer Mühe und ohne dass die Rechnung gegenüber derjenigen bei einer Kugel wesentliche Abänderungen erfährt, berücksichtigen. Die Reihenentwickelungen, als deren Argument die geocentrische (nicht die geographische) Breite oder besser ihr Complement einzuführen ist, schreiten wie dort nach Kugelfunktionen fort; es treten nur gewisse konstante Faktoren hinzu, über deren Bedeutung Folgendes zu sagen ist. Eine erste Gruppe dieser Faktoren hängt allein von der Abplattung der Erde ab. Ich habe sie unter Benutzung der Besselschen Zahl $1:\alpha=$ 1:299, 1528 berechnet und a. a. O. (S. 12) unter der Bezeichnung p_m^n , π_m^n , q_m^n , \varkappa_m^n bis zur 6. Ordnung einschliesslich (d. h. für $0 \le m \le n \le 6$) mitgeteilt. Hier stelle ich die für den vorliegenden Zweck allein nötigen Quotienten $\pi_m^n:p_m^n$ und $\varkappa_m^n:q_m^n$ zusammen (Tabelle Ia und Ib). Die Zahlen dieser beiden Tabellen sind um eine Einheit der 6. Dezimalstelle unsicher, da die bei ihrer Bildung benutzten Werte von $p_m^n \pi_m^n$ u. s. w. auf 6 Stellen abgerundet worden sind. Eine zweite Gruppe von Faktoren hängt ausser von der Abplattung auch von der Breite ab. Sie sind durch die Gleichungen

(1)
$$\alpha = \sqrt{1 + \epsilon^2 \cos v^2}$$
 $\beta = \sqrt{1 + \epsilon^2}$ $\gamma = \sqrt{1 + \epsilon^2 \cos v^2}$: $\sqrt{1 + \epsilon^2}$ $(\epsilon^2 = 0.00671922)$

definiert. Hierin ist, wenn a den Aequatorialradius und b den Polarradius des Erdellipsoids bezeichnet:

$$\epsilon^2 = (a^2 - b^2) : b^2 = (2\alpha - 1) : (\alpha - 1)^2$$

Ferner ist v der geocentrische Polabstand, der mit dem geographischen, u, durch die bekannte Beziehung

$$\operatorname{tg} v = \sqrt{1 + \varepsilon^2} \operatorname{tg} u$$

verknüpft ist. Tabelle II enthält, von 5° zu 5° nach u fortschreitend, die zugehörigen Werte von α , (β) , γ , sowie die Werte von α sin v und β sin v, die für die numerische Rechnung wichtiger, als α und β selbst sind. Bei der Berechnung von v wurde eine stark abgekürzte Näherungsformel benützt; die angegebenen Werte weichen daher von den wahren teilweise um mehr als 0,5'', doch stets um weniger als 1'' ab. Nachdem ich sie einmal der weiteren Rechnung zugrunde gelegt hatte, war eine nachträgliche Aenderung, die einen grossen Aufwand von Korrektionsrechnungen erfordert hätte, bei der vollkommenen Bedeutungslosigkeit jener Abweichungen für den vorliegenden Zweck ausgeschlossen.

In den nach Kugelfunktionen vorgenommenen Entwickelungen habe ich eine Abweichung von dem üblichen Verfahren eingeführt. Dem von Gauss gegebenen Vorbilde folgend, hat man die Reihen gewöhnlich nach den Funktionen $P_m^n(\cos v)\cos m\lambda$ und $P_m^n(\cos v)\sin m\lambda$ mit

(2)
$$P_{m}^{n}(\cos v) = \sin v^{m} \left[\cos v^{n-m} - \frac{(n-m)(n-m-1)}{2(2n-1)}\cos v^{n-m-2} + \frac{(n-m)(n-m-1)(n-m-2)(n-m-3)}{2\cdot 4\cdot (2n-1)(2n-3)}\cos v^{n-m-4} - \dots \right]$$

entwickelt. Der Umstand indessen, dass diese Funktionen von merklich verschiedener Grössenordnung sind ($P_1^{\rm I}$, $P_1^{\rm 3}$, $P_1^{\rm 5}$, $P_1^{\rm 7}$ und damit auch $P_1^{\rm I}\cos\lambda$ u. s. w. erreichen beispielsweise die Maximalwerte 1, 0,275, 0,082, 0,023) führt bei numerischen Rechnungen zu recht störenden Uebelständen. Vor allem ist der Einfluss der einzelnen Glieder der nach Kugelfunktionen entwickelten Reihe auf den dargestellten Wert nicht ihren Coeffizienten proportional, und es wird dadurch der rasche Ueberblick über den ungefähren Funktionsverlauf und über die den einzelnen Gliedern zukommende Bedeutung wesentlich erschwert. Die mit Kugelfunktionen höherer Ordnung multiplizierten Coeffizienten, bei denen nicht m ganz oder nahezu gleich n ist, sind z. B. im Verhältnis zu ihrer Bedeutung mit den andern verglichen viel zu gross. Demgemäss müssten nun eigentlich, da es keinen Sinn hat, in einem Aggregat von Gliedern einzelne wesentlich schärfer als die übrigen anzugeben, die Coeffizienten verschieden scharf angesetzt werden. Dieses unbequeme und überdies, da eine Dezimalstelle mehr oder weniger die Schärfe der Darstellung schon

beträchtlich ändert, ziemlich rohe Auskunftsmittel hat man thatsächlich wohl kaum jemals benützt; man hat vielmehr, so viel mir bekannt ist, stets alle Coeffizienten bis zu derselben dezimalen Einheit berechnet, was nach dem zuvor Gesagten nicht zu rechtfertigen ist. Es mag drittens daran erinnert werden, dass die Bildung und Auflösung von Gleichungssystemen zur Berechnung der Reihencoeffizienten sehr erleichtert wird, wenn die Faktoren dieser Unbekannten, hier also die Funktionswerte der P_m^n , unter einander möglichst wenig verschieden sind.

Die gleichfalls übliche, besonders in England benützte Entwickelung nach den Functionen

$$P_{n} = \sqrt{a_{0}^{n}} \cdot P_{0}^{n}, \quad T_{n}^{m} = \frac{d^{m} P_{n}}{d \mu^{m}} \sin v^{m} = \frac{n!}{(n-m)!} \sqrt{a_{0}^{n}} P_{m}^{n} = \sqrt{\frac{(n+m)!}{2(n-m)!}} a_{m}^{n} P_{m}^{n}$$

$$(3) \quad \text{mit} \qquad \qquad \mu = \cos v$$

$$\text{und } a_{0}^{n} = \frac{[1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)]^{2}}{n! \cdot n!}, \quad a_{m}^{n} = 2 \frac{[1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)]^{2}}{(n-m)! \cdot (n+m)!} \text{ für } m > 0$$

führt, nur im umgekehrten Sinne und in noch gesteigertem Masse, zu denselben Uebelständen. Die Funktionen P_n erreichen sämtlich 1 als Maximalwert, dagegen nehmen die T_n^m mit wachsendem n und m im Gegensatz zu den P_n^n sehr schnell zu. Es ist z. B. $T_2^1 = 3 P_1^2$, $T_2^2 = 3 P_2^2$, $T_6^1 = \frac{693}{8} P_1^6$, $T_6^6 = 10395 P_6^6$ und die höchsten Werte von T_2^1 , T_2^2 , T_6^1 , T_6^6 sind 1,5, 3, 37,1 und 10395. Die Coeffizienten der höheren Reihenglieder werden also hier viel kleiner, als sie ihrer Bedeutung nach sein sollten.

Durch diese Erwägungen veranlasst habe ich in allen Entwickelungen an Stelle der P_m^n gewisse Vielfache derselben, $R_m^n = r_m^n \cdot P_m^n$, eingeführt, die so gewählt sind, dass bei allen der quadratische Mittelwert von $R_m^n \cos m\lambda$ und $R_m^n \sin m\lambda$ auf der ganzen Kugelfläche dieselbe Grösse, nämlich 1, erreicht. (Es könnte vielleicht zweckmässiger erscheinen, zu bestimmen, dass der Mittelwert von R_m^n durchgängig gleich 1 sein solle, wobei dann für m>0 jede der Funktionen $R_m^n \cos m\lambda$ und $R_m^n \sin m\lambda$ im quadratischen Durchschnitt gleich $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ würde. Da indessen hier bei der Einführung der R_m^n ausschliesslich praktische Rücksichten ausschlaggebend sein sollten, so schien es, weil in den folgenden numerischen Darstellungen die Glieder mit den Faktoren $R_m^n \cos m\lambda$ und $R_m^n \sin m\lambda$ stets selbständig auftreten, besser, in der zuvor erwähnten Weise zu verfahren, die übrigens auch für die Theorie vorteilhaft ist.)

Es ist nun, wenn $d\omega$ das Oberflächenelement der Kugel bezeichnet, bei der Integration über die ganze Kugelfläche

$$\int (P_m^n(\cos v)\cos m\lambda)^2 d\omega = \int (P_m^n(\cos v)\sin m\lambda)^2 d\omega = \frac{4\pi}{(2n+1)a_m^n}$$

In Bezug auf das erste Integral gilt diese Gleichung allgemein; in Bezug auf das zweite natürlich nur, wenn m von 0 verschieden ist. Der Mittelwert von $P_m^n \cos m\lambda$ und $P_m^n \sin m\lambda$ wird also, da die Kugelfläche gleich 4π ist, $((2n+1)a_m^n)^{-\frac{1}{2}}$. Daraus folgt unmittelbar, dass R_m^n die verlangte Beschaffenheit erhält, wenn man

$$(4) R_m^n(\cos v) = r_m^n \cdot P_m^n(\cos v) = \sqrt{(2n+1)} \, a_m^n \cdot P_m^n(\cos v)$$

00076823

setzt. Die hiernach berechneten Werte der Faktoren r_m^n finden sich in Tabelle III zusammengestellt, während Tabelle IV die Werte der Funktionen R_m^n selbst von der 1. bis zur 7. Ordnung enthält.

Es darf nicht übersehen werden, dass eine vollkommene Gleichwertigkeit der Funktionen R_m^n nur in Bezug auf ihre mittleren Beträge besteht. Ihre Maximalwerte sind verschieden; die Differenzen sind aber viel geringer als bei den P_m^n . Unter den Funktionen der ersten 7 Ordnungen (von der Konstanten $R_0^0 = 1$ abgesehen) haben R_0^1 und R_1^1 das kleinste Maximum im Betrage von 1,732, während das grösste, dasjenige von R_0^7 , 3,873 beträgt. Der Umstand, dass hier im Gegensatz zu den Funktionen P_m^n die Maxima mit steigendem n nicht abnehmen, sondern zunehmen, kann obendrein als günstig bezeichnet werden, weil dadurch bei gleicher Dezimalstellenzahl der Coeffizienten gerade die ersten, wichtigsten Glieder der Entwickelung etwas schärfer als die übrigen erhalten werden.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, die durch die Einführung der R_m^n an Stelle der P_m^n herbeigeführten Aenderungen durch ein Beispiel zur Anschauung zu bringen. Ich wähle zu diesem Zwecke die Entwickelung des erdmagnetischen Potentials für den Zeitpunkt 1885,0 nach der Berechnung von Neumayer-Petersen, die man in den "Vorbemerkungen" zur 4. Abteilung von Berghaus' Physikalischem Atlas (S. 19) mitgeteilt findet. Gemäss den Bemerkungen auf S. 5 meiner zu Anfang erwähnten Abhandlung gebe ich allen Zahlen das entgegengesetzte Vorzeichen; ausserdem führe ich als Einheit die Grösse $0,1^5$ c $m^{-\frac{1}{2}}$ $g^{\frac{1}{2}}$ s^{-1} ein. Mit diesen Abänderungen entnehme ich der angegebenen Publikation die folgenden Coeffizienten der nach den Funktionen P_m^n entwickelten Reihe für (V:R):

00076823

n:	lexe bleggette oak	dreemslee 2 hallbad	O ach a 3 prove	4
g_0^n	-31572,0	— 790,6	2436,3	3439,5
g_1^n	- 2481,4	4979,8	-3956,0	3059,7
h_1^n	6025,8	-1299,9	— 738,3	1187,7
g_2^n		566,7	2785,7	1975,4
h_2^n		1260,4	44,3	— 714,7
g_3^n		oib all offe bu	327,0	- 684,2
h_3^n			549,2	- 512,1
g_4^n				84,9
h_4^n				- 96,8

Die Coeffizienten der Entwickelung nach den Funktionen \mathbb{R}_m^n sind dagegen:

n:	1	stady 2	3	tob no 141
g_0^n	-18228,1	- 235,7	368,3	262,1
g_1^n h_1^n	-1432,6 $3479,1$	1285,8 $-335,7$	- 488,3 - 91,1	184,3 71,6
$egin{array}{c} g_2^n \ h_2^n \end{array}$	Total Street of Street	292,6 650,9	543,7 8,6	-60,9
g_3^n h_3^n	oib "I nonorthuid mede think and		156,3 262,6	-109,0 $-81,6$
g_4^n h_4^n	dell'edelautie et l'édeau délezioi windiche de l'éde	te tell desirable. Set et more gif slore		38,3 — 43,7

Nach diesen, den folgenden Darlegungen zur Vermeidung störender Exkurse vorausgeschickten Erläuterungen stelle ich in möglichster Kürze den Gang der Rechnung im Anschluss an meine frühere Arbeit dar. In dieser habe ich noch die Entwickelung nach den Funktionen P_m^n vorausgesetzt; ich übertrage indessen die dort eingeführten Bezeichnungen hier ohne weiteres auf die entsprechenden Entwickelungen nach den Funktionen R_m^n . Die dadurch in manchen Formeln nötig werdenden Modifikationen, die sich auf den Eintritt konstanter, von den r_m^n abhängiger Faktoren beschränken, sind leicht ersichtlich; ich glaube sie deshalb, ebenso wie einige nebensächliche Abänderungen der Bezeichnung, ohne ausdrückliche Hervorhebung einführen zu dürfen.

Die beobachteten Werte der erdmagnetischen Elemente an möglichst zahlreichen Punkten der Erdoberfläche bilden die empirische Grundlage der ganzen Rechnung. Aus ihnen sind zunächst die Kraftkomponenten X (horizontal nach Norden), Y (horizontal nach Osten) und Z (vertikal nach unten) zu berechnen, für die alsdann mit Rücksicht auf die sphäroidische Gestalt der Erde die von ihnen nur wenig abweichenden Grössen αX , βY , γZ , die ich \overline{X} , \overline{Y} , \overline{Z} genannt habe, treten.

00076823

Die erste Aufgabe ist nun die, eine analytische Darstellung der Verteilung der Werte von \overline{X} , \overline{Y} , \overline{Z} über die ganze Erdoberfläche zu finden. Diese Aufgabe kann, theoretisch betrachtet, mit beliebig weit getriebener Annäherung an den wahren Zustand gelöst werden, indem man die Grössen $\overline{X}\sin v$, $\overline{Y}\sin v$ und \overline{Z} durch Reihen, die nach Kugelfunktionen der Argumente v und λ (der geographischen Länge) fortschreiten, darstellt. (Bei \overline{X} und \overline{Y} selbst ist diese Form der Darstellung nicht möglich, da sie an den Polen unstetig werden. Dagegen könnten allerdings andere Ausdrücke, z. B. $(\overline{X}\cos\lambda + \overline{Y}\cos v\sin\lambda)$ und $(\overline{X}\sin\lambda - \overline{Y}\cos v\cos\lambda)$, an die Stelle von $\overline{X}\sin v$ und $\overline{Y}\sin v$ treten.)

Aus den für $\overline{X}\sin v$ und $\overline{Y}\sin v$ gefundenen Reihen hat man nun weiter die Funktionen

en
$$U=\int\limits_0^v ar{X}\,dv\,, \qquad W=\psi(v)-\int\limits_0^\lambda ar{Y}\sin v\,d\lambda$$

abzuleiten, wobei $\psi(v)$ den von λ unabhängigen Teil von U bezeichnet. Ergeben sich beide als identisch, so stellen sie bis auf einen konstanten Faktor das Potential V des Erdmagnetismus in der Erdoberfläche dar; es ist nämlich alsdann V der gemeinsame Wert von b U und b W, wenn b den Polarradius der Erde bedeutet.

Fallen U und W verschieden aus, so ist damit der Beweis geliefert, dass die magnetische Kraft in der Erdoberfläche kein Potential besitzt, woraus auf die Existenz von elektrischen Strömen, die senkrecht durch diese Fläche hindurchgehen, geschlossen werden kann. Die Dichte, d. h. die auf die Flächeneinheit bezogene Intensität dieser Ströme ergiebt sich eindeutig aus der Differenz (W-U). In welcher Weise aber diese Ströme innerhalb und ausserhalb der Erdoberfläche geschlossen sind, bleibt dabei vollkommen unbestimmt und damit der Anteil, den sie am Zustandekommen der Werte von U und W, also auch von \overline{X} und \overline{Y} , sowie derjenigen von \overline{Z} haben.

Verlangt man nun, dass dieser Anteil ein Minimum sei, insbesondere, dass \overline{Z} nirgends geändert werde, so bleibt ein möglichst grosser Teil zurück, dem ein Potential zukommt. Dasselbe werde wiederum mit V bezeichnet.

Hält man endlich die Reihenentwickelung von V mit derjenigen der vertikalen Komponente \overline{Z} zusammen, so kann man das von äussern und das von innern Agentien herrührende Potential trennen.

Das Endergebnis wird somit durch drei Funktionen V_i , V_a und $\bar{i}\sin v$ $(=\alpha\beta i\sin v)$ gebildet, die genau den in den Reihen für $\bar{X}\sin v$, $\bar{Y}\sin v$ und \bar{Z} dargestellten Zustand des magnetischen Feldes an der Erdoberfläche zum Ausdruck bringen, und die daher gleichfalls durch Vervollkommnung der Beobachtungsdaten und Weiterführung der Reihenentwickelung den wahren Werten beliebig nahe gebracht werden können. V_i ist das Potential magnetischer Massen oder geschlossener Ströme im Erdinnern, V_a dasjenige ebensolcher Agentien im äussern Raume, endlich i die Intensität der zur Erdoberfläche senkrechten, sie durchdringenden Strömung, die innerhalb und ausserhalb so geschlossen zu denken ist, dass ihre Wirkung in dieser Fläche selbst ein Minimum ist.

Der im Vorhergehenden skizzierte Gang der Rechnung wird durch die folgenden Formeln dargestellt.

Es sei

es cambanamente del del all'antique del

Das Zeichen $\sum f_m^n$ steht hier und in der Folge überall für $\sum \sum \sum p_m^n$ Die Entwickelung von \overline{Z} unterliegt nur der Bedingung, dass $j_0^n=0$ sein muss; diejenigen von $\overline{X}\sin v$ und $\overline{Y}\sin v$ sind dagegen durch eine Reihe von Bedingungsgleichungen verknüpft, die in ihrer Gesamtheit aussagen, dass die horizontale Komponente der erdmagnetischen Kraft nebst allen ihren Differentialquotienten an beiden Polen (d. h. für v=0 und $v=180^{0}$) endlich und von eindeutig bestimmter Richtung ist, dass also die Pole keine Unstetigkeitspunkte für sie sind. Diese Bedingungsgleichungen heissen, wenn R_m^n in der Nähe des Nordpols (v=0) bis auf unendlich kleine Grössen höherer Ordnung gleich $\alpha_m^n \sin v^m$, in der Nähe des Südpols ($v=180^{0}$) also gleich $(-1)^{n-m} \alpha_m^n \sin v^m$ ist, und wenn

adial and entertain
$$\Sigma^0 f_m^n = f_m^m + f_m^{m+2} + \dots$$
 for some form $\Sigma^0 f_m^n = f_m^{m+1} + f_m^{m+3} + \dots$ for a some form $\Sigma^1 f_m^n = f_m^{m+1} + f_m^{m+3} + \dots$

eingeführt wird:

(6)
$$\Sigma^{0} \alpha_{m}^{n} B_{m}^{n} - \Sigma^{1} \alpha_{m}^{n} E_{m}^{n} = 0 \qquad \Sigma^{0} \alpha_{m}^{n} C_{m}^{n} + \Sigma^{1} \alpha_{m}^{n} D_{m}^{n} = 0$$

$$\Sigma^{1} \alpha_{m}^{n} B_{m}^{n} - \Sigma^{0} \alpha_{m}^{n} E_{m}^{n} = 0 \qquad \Sigma^{1} \alpha_{m}^{n} C_{m}^{n} + \Sigma^{0} \alpha_{m}^{n} D_{m}^{n} = 0$$

$$\Sigma^{1} \alpha_{m}^{n} C_{m}^{n} + \Sigma^{0} \alpha_{m}^{n} D_{m}^{n} = 0$$

Für m=0 verschwindet jede der beiden Summen, aus denen sich die linke Seite jeder Gleichung zusammensetzt, da $E_o^n=C_o^n=0$ ist. Die Funktionswerte α_m^n sind durch die Formel

(7)
$$\alpha_m^n = 2^{n-m} \frac{n! (n+m)!}{m! (2n)!} r_m^n$$

bestimmt. Speziell ist

$$\alpha_m^m = r_m^m, \quad \alpha_m^{m+1} = r_m^{m+1}, \quad \alpha_m^{m+2} = \frac{2m+2}{2m+3} r_m^{m+2}, \quad \alpha_m^{m+3} = \frac{2m+2}{2m+5} r_m^{m+3}$$

(Die entsprechende Angabe der Werte von P_m^n für v = 0, a. a. O. S. 21, und die daraus geschlossene Gleichung (14) sind, ausser für m = 0, unrichtig.)

(Die hier zur analytischen Darstellung der Komponenten des Erdmagnetismus entwickelte Methode kann natürlich auf alle Fälle Anwendung finden, in denen eine stetige, nach Grösse und Richtung überall eindeutig definierte Funktion (eine Vektorfunktion) vorliegt, während für eine variable skalare Grösse die gewöhnliche, bekannte Entwickelung zu benützen ist. Fällt die Richtung des Vektors überall in die Ellipsoidfläche selbst, so genügen die in Bezug auf \overline{X} und \overline{Y} angegebenen Entwickelungen; andernfalls tritt, wie hier, eine einfache Darstellung der vertikalen Komponente nach Kugelfunktionen, im allgemeinen ohne die Bedingung $j_0^0 = 0$, hinzu.)

Aus der für $\overline{Y}\sin v$ gefundenen Entwickelung ergiebt sich sofort:

$$W = \psi(v) - (D_0^0 + D_0^1 R_0^1 + D_0^2 R_0^2 + \ldots) \lambda + \sum R_m^n \left(\frac{1}{m} E_m^n \cos m\lambda - \frac{1}{m} D_m^n \sin m\lambda\right)$$

$$= \psi(v) - \sin v^2 \varphi(v) \lambda + W_1 \qquad (m > 0)$$

Weniger einfach gestaltet sich die Ableitung von U aus $X \sin v$. Wenn

$$\int\limits_0^v \sin v^{m-1} \, dv = \varPi_m$$

gesetzt und durch zwei sogleich anzugebende Gleichungssysteme eine Reihe neuer Koeffizienten $\pi_m (= \eta_m \cos m \lambda + \zeta_m \sin m \lambda)$, G_m^n , H_m^n eingeführt wird, so ergiebt sich

(9)
$$U = (\pi_1 \Pi_1 + \pi_2 \Pi_2 + \ldots) + \Sigma R_m^n (G_m^n \cos m\lambda + H_m^n \sin m\lambda) = f(v, \lambda) + U_0$$

Speziell ist
$$\psi(v) = G_0^0 + G_0^1 R_0^1 + G_0^2 R_0^2 + \ldots$$

Um die erwähnten Gleichungssysteme in einer für die numerische Rechnung möglichst geeigneten Form zu erhalten, führe ich die folgenden Bezeichnungen ein:

$$(n)_{m} = \frac{n^{2} - m^{2}}{4 n^{2} - 1}$$

$$(10) \qquad \lambda_{m}^{0} = 1, \quad \lambda_{m}^{1} = 1, \quad \lambda_{m}^{p} = \lambda_{m}^{p-2} \frac{(m+p)(m+p-1)_{m}}{m+p-1}$$

$$\lambda_{m}^{p} r_{m}^{m+p} = \mu_{m}^{p}, \quad (m+p-1) \lambda_{m}^{p} r_{m}^{m+p-1} = \nu_{m}^{p}$$

Um nicht die Gleichungen zweimal (für die Koeffizienten der Kosinus und für die der Sinus von $m\lambda$) ansetzen zu müssen, schreibe ich noch

$$B_m^n \cos m\lambda + C_m^n \sin m\lambda = A_m^n$$
, $G_m^n \cos m\lambda + H_m^n \sin m\lambda = F_m^n$

Funktion (eine Vektorfunktion) vorheet, wahrend für eine variable skalare

all generations die Bedingung Latte. O. happy of the lands and another the

Nunmehr lauten die Gleichungen folgendermassen:

$$\pi_{m} = \mu_{m}^{0} A_{m}^{m} + \mu_{m}^{2} A_{m}^{m+2} + \mu_{m}^{4} A_{m}^{m+4} + \dots
\nu_{m}^{2} F_{m}^{m+1} = \mu_{m}^{2} A_{m}^{m+2} + \mu_{m}^{4} A_{m}^{m+4} + \dots
\nu_{m}^{4} F_{m}^{m+3} = \mu_{m}^{4} A_{m}^{m+4} + \dots$$

$$\mu_{m}^{4} A_{m}^{m+4} + \dots$$

$$\nu_m^1 F_m^m = \mu_m^1 A_m^{m+1} + \mu_m^3 A_m^{m+3} + \mu_m^5 A_m^{m+5} + \dots
\nu_m^3 F_m^{m+2} = \mu_m^3 A_m^{m+3} + \mu_m^5 A_m^{m+5} + \dots
\nu_m^5 F_m^{m+4} = \mu_m^5 A_m^{m+5} + \dots$$
(12)

Aus dem Anblick der Gleichungen geht hervor, dass man, um U und W bis zu Funktionen einer bestimmten gleichen Ordnung (n) entwickelt zu erhalten, $\overline{Y}\sin v$ ebensoweit, $\overline{X}\sin v$ dagegen bis zu den Gliedern der nächsthöheren Ordnung entwickeln muss.

Nachdem U und W berechnet worden sind, findet man einerseits das Potential

(13)
$$V = \frac{b}{2} (U_0 + W_0) = b \Sigma R_m^n (g_m^n \cos m\lambda + h_m^n \sin m\lambda)$$

andrerseits die Stromdichte der die Erdoberfläche vertikal durchdringenden

ausaben: ebenso ist es moglich, die ausaern Luifte, die in der Erdoberffähle

damage and in der Destlache in Betracht kommen. Vichtiger, weil für die

Bedeuting; ist as dass sich derselbe Erfolg, wie man weiss, durch eine

oberdacho eme mendirek benachberter Flache erfüllen. da Werkhobkeit int

Strömung
$$i = \frac{1}{4\pi\alpha\beta \, b \sin v} \, \frac{\partial^2 (W - U)}{\partial v \partial \lambda}$$

Als positiv gelten hierbei die ins Innere der Erde gerichteten Ströme.

Schliesslich ergeben sich die Koeffizienten des Potentials innerer Kräfte

$$(15) V_i = b \sum R_m^n \left(c_m^n \cos m\lambda + s_m^n \sin m\lambda \right)$$

und diejenigen des aus äusseren Kräften entspringenden

$$(16) V_a = b \sum R_m^n \left(\gamma_m^n \cos m\lambda + \sigma_m^n \sin m\lambda \right)$$

Schricht von endlicher Dieke zu denken; es ist when leicht einzielen, da durch die Gleichungen:

$$c_m^n = \varepsilon_m^n g_m^n - \delta_m^n j_m^n \qquad s_m^n = \varepsilon_m^n h_m^n - \delta_m^n k_m^n$$

$$\gamma_m^n = g_m^n - c_m^n \qquad \sigma_m^n = h_m^n - s_m^n$$

$$(17)$$

in denen

(18)
$$\delta_m^n = 1: (n \frac{\pi_m^n}{p_m^n} + (n+1) \frac{\pi_m^n}{q_m^n}) \text{ und } \epsilon_m^n = n \frac{\pi_m^n}{p_m^n} \delta_m^n$$

von der Abplattung der Erde abhängige Konstanten sind. In den Tafeln Ic und Id findet man ihre, aus den Zahlen von Ia und Ib abgeleiteten Werte zusammengestellt. (Durch ein Versehen sind a. a. O. S. 23 in den vorstehend mitgeteilten Gleichungen die Koeffizienten c, s mit γ , σ vertauscht worden.)

nebied an allere rebei an ted aumeitemest heiden nebiert meter Stelle zu beiden

Das Schlussresultat der ganzen Rechnung sind die drei nach Kugelfunktionen fortschreitenden Reihen für V_i : b, V_a : b und $\alpha \beta b i$, von denen die letzte, wie man leicht einsieht, in der Ordnung der höchsten Glieder der Entwickelung hinter den beiden andern um einen Grad zurückbleibt.

Aus diesen drei Reihen, deren Koeffizienten vollkommen von einander unabhängig sind, können unter Beachtung der für die Ableitung von V:baus U und W getroffenen Festsetzung rückwärts die Reihen für X sin v, Y sin v und Z gewonnen werden, was keiner weiteren Ausführung bedarf.

Ich füge der vorstehenden Formelzusammenstellung noch einige Entwickelungen hinzu, auf die ich in der mehrfach erwähnten Arbeit nur hingewiesen habe, ohne sie abzuleiten, weshalb ich hier auch auf ihre Begründung kurz eingehen will. Es ist bekanntlich möglich, auf einer der Erdoberfläche unendlich benachbarten, innern Fläche eine eindeutig bestimmte Verteilung von freiem Magnetismus anzunehmen, der in der Erdoberfläche selbst und im ganzen äussern Raume dieselben magnetischen Wirkungen entsprechen, wie sie die thatsächlich vorhandenen, als Ursache von V_i erkannten Agentien ausüben; ebenso ist es möglich, die äussern Kräfte, die in der Erdoberfläche das Potential V, haben, durch eine bestimmte Magnetisierung einer ihr unendlich nahen äussern Fläche zu ersetzen, soweit allein ihre Wirkungen im innern Raume und in der Oberfläche in Betracht kommen. Wichtiger, weil für die physikalische Erklärung des Erdmagnetismus wahrscheinlich von grösserer Bedeutung, ist es, dass sich derselbe Erfolg, wie man weiss, durch eine Anordnung von elektrischen Strömen erreichen lässt, die parallel der Erdoberfläche eine unendlich benachbarte Fläche erfüllen. (In Wirklichkeit hat man sich natürlich, wie übrigens auch im ersten Falle, statt der Fläche eine Schicht von endlicher Dicke zu denken; es ist aber leicht einzusehen, dass, wenn deren Dicke und ihr Abstand von der Erdoberfläche gegen den Erdradius nur klein sind, die durch einfache vertikale Verschiebung unter passender Reduktion der Dichtigkeit bewirkte Kondensation der ganzen Strömung in eine Fläche die Gesamtwirkung nur um kleine Grössen höherer Ordnung ändert.) Die Verteilung dieser Strömung sowie jener magnetischen Belegung soll nun noch berechnet werden.

Das Potential des in einer Fläche (von nirgends unendlich grosser Krümmung) ausgebreiteten freien Magnetismus hat an jeder Stelle zu beiden Seiten der Fläche denselben Betrag. Genauer gesagt: bezeichnet V_{ε} das Potential in einem Punkte, dessen nach bestimmt festgesetzter Richtung positiv gerechneter Abstand von der Fläche ε ist, so haben $V_{+\varepsilon}$ und $V_{-\varepsilon}$ innerhalb einer und derselben Normalen bei unendlich abnehmendem ε denselben Grenzwert; es ist in oft gebrauchter symbolischer Schreibweise

Similar one fortschreitenden Heiben
$$V_{-0} = V_{-0} + V_{-0}$$
 and $v_{-1} + v_{-1} + v_{-1}$

Die Aenderung des Potentials oder, was dasselbe ist, die zur Fläche senkrechte Komponente der Kraft ist dagegen, soweit sie von dem unendlich benachbarten Teile der magnetischen Belegung herrührt, auf beiden Seiten zwar dem absoluten Betrage nach gleich, aber entgegengesetzt gerichtet. Die Differenz der beiderseitigen Werte hängt von der Flächendichtigkeit ϱ an der

betreffenden Stelle ab. Was aber den Einfluss der übrigen, in endlicher Entfernung befindlichen Belegung betrifft, so liefert er als stetig veränderlich zu jener Differenz den Beitrag Null; diese bleibt somit ungeändert und ist nur von ø abhängig. Symbolisch geschrieben ist

discondent limit (31) grandors
$$\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{+0} - \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{-0} = -4\pi\varrho$$
(Aut also for the limit $\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{+0} - \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{-0} = -4\pi\varrho$

oder bei der hier zu betrachtenden Anwendung auf die magnetische Kraft in der Erdoberfläche

$$Z_{+0} - Z_{-0} = -4\pi\varrho$$

Hierbei gilt, umgekehrt wie bei Z, die Richtung der Normalen von innen nach aussen, d. h. von unten nach oben, als positiv.

Wird andrerseits die (einfach zusammenhängende) Fläche von elektrischen Strömen durchflossen, so ist die von diesen hervorgerufene magnetische Kraft beim Durchgange durch die Fläche stetig veränderlich; es ist insbesondere auch

$$\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{+0} = \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{-0}$$

oder

Das Potential dagegen ist an dieser Stelle unstetig; die Differenz seiner beiderseitigen Werte in unendlich benachbarten Punkten derselben Normalen ist der Gesamtintensität S derjenigen in der Fläche verlaufenden Ströme proportional, die den betrachteten Punkt einschliessen:

zeichnung übereinstrumen.
$$Z_{\pi} = 4\pi S_{\pi} = 4\pi S_{\pi} = 6$$
ie Gleichungen (18) und (21)

Bei der Berechnung von S sind diejenigen Ströme, die, von der Seite der positiven Normalen aus gesehen, in positivem Sinne (gegen den Uhrzeiger) verlaufen, als positiv, die andern als negativ anzusetzen.

Die Gesamtintensität S ist nun offenbar für alle Punkte einer Strömungslinie dieselbe, und sie ändert sich beim Uebergange von einer solchen Linie zu einer andern um den Betrag der zwischen beiden verlaufenden Strömung. S = Const.Es ist daher

$$S = Const.$$

die allgemeine Gleichung der Stromlinien, und die gesamte zwischen $S=S_1$ und $S = S_2$ vorhandene Strömung hat die Intensität $S_2 - S_1$. Die Stromdichte ist dem wechselnden Abstande der Linien S = Const. umgekehrt proportional, 00076823

die Stromrichtung so beschaffen, dass man, von der Seite der positiven Normalen aus daran entlang blickend, wachsende Werte von S zur Linken hat.

In die vorstehenden Gleichungen sind nun die zur Definition des magnetischen Zustandes der Erdoberfläche, soweit derselbe ein Potential besitzt, dienenden Entwickelungen einzuführen. Es ist nach Gleichung (15) und (16)

$$V_i = b \sum R_m^n (c_m^n \cos m\lambda + s_m^n \sin m\lambda)$$
 $V_a = b \sum R_m^n (\gamma_m^n \cos m\lambda + \sigma_m^n \sin m\lambda)$ oder kürzer

$$V_i = b \Sigma J_m^n$$

$$V_a = b \Sigma A_m^n$$

 V_i lässt sich, da es von innern Kräften herrührt, ohne weiteres in den äussern Raum fortsetzen, V_a aus entsprechendem Grunde in das Erdinnere hinein. Dagegen ist hier V_i und dort V_a zunächst unbestimmt. Ich setze demgemäss

$$(V_{i})_{+\varepsilon} = b \Sigma J_{m}^{n} \left(\frac{r}{b}\right)^{-n-1} \qquad (V_{a})_{+\varepsilon} = b \Sigma B_{m}^{n} \left(\frac{r}{b}\right)^{-n-1}$$

$$(V_{a})_{+\varepsilon} = b \Sigma K_{m}^{n} \left(\frac{r}{b}\right)^{n} \qquad (V_{a})_{-\varepsilon} = b \Sigma A_{m}^{n} \left(\frac{r}{b}\right)^{n}$$

$$(V_{a})_{-\varepsilon} = b \Sigma A_{m}^{n} \left(\frac{r}{b}\right)^{n} \qquad (V_{a})_{-\varepsilon} = b \Sigma A_{m}^{n} \left(\frac{r}{b}\right)^{n}$$

Zur Vereinfachung der Formeln will ich im Folgenden die fortwährend wiederkehrenden Indices m und n überall (auch bei den noch neu eintretenden Grössen M, N, π , p, \varkappa , q, δ , ε) weglassen, was ebensowenig stören wird, wie der Umstand, dass die hier vorübergehend eingeführten Funktionen A_m^n und B_m^n mit den an anderer Stelle auftretenden Koeffizienten von $\bar{X}\sin v$ in der Bezeichnung übereinstimmen.

Zur Ableitung von Z aus V muss ich auf die Gleichungen (18) und (21) meiner früheren Arbeit verweisen, denen zufolge sich aus

$$V=b\, \Sigma \left(M(rac{r}{b})^{-n-1}+N(rac{r}{b})^n
ight)$$

für Z der Wert

$$Z = \frac{\partial V}{\partial n} = \frac{1}{\gamma} \Sigma \left(-(n+1)\frac{\varkappa}{q} M + n\frac{\pi}{p} N \right)$$

ergiebt. Im vorliegenden Falle wird also

$$(Z_{i})_{+\varepsilon} = -\frac{1}{\gamma} \Sigma(n+1) \frac{\varkappa}{q} J \qquad (Z_{a})_{+\varepsilon} = -\frac{1}{\gamma} \Sigma(n+1) \frac{\varkappa}{q} B$$

$$(Z_{i})_{-\varepsilon} = \frac{1}{\gamma} \Sigma n \frac{\pi}{p} K \qquad (Z_{a})_{-\varepsilon} = \frac{1}{\gamma} \Sigma n \frac{\pi}{p} A$$

Setzt man nun erstens, um die beobachteten Kräfte als Wirkungen einer magnetischen Oberflächenbelegung der Erde darzustellen, $V_{+0} = V_{-0}$, so folgt aus (19) (für alle Indices n, m)

$$J = K$$
 $A = B$

und damit wird mit Rücksicht auf (18) und (20)

$$-4\pi\varrho_{i} = (Z_{i})_{+0} - (Z_{i})_{-0} \qquad -4\pi\varrho_{a} = (Z_{a})_{+0} - (Z_{a})_{-0}$$

$$= -\frac{1}{\gamma}\Sigma\frac{J}{\delta} \qquad = -\frac{1}{\gamma}\Sigma\frac{A}{\delta}$$

Verlangt man dagegen, um die beobachteten Wirkungen auf Ströme zurückzuführen, dass identisch $Z_{+0}=Z_{-0}$ sein soll, so gelangt man durch die Gleichungen (20) zu den Beziehungen

$$-(n+1)\frac{\alpha}{q}J=n\frac{\pi}{p}K \qquad -(n+1)\frac{\alpha}{q}B=n\frac{\pi}{p}A$$

und erhält alsdann aus (19) und (18) mit leichter Umformung:

$$4\pi S_i = (V_i)_{+0} - (V_i)_{-0} \qquad 4\pi S_a = (V_a)_{+0} - (V_a)_{-0}$$

$$= b \Sigma \frac{J}{\varepsilon} \qquad = -b \Sigma \frac{A}{1-\varepsilon}$$

In den so gewonnenen Gleichungen, die in ausführlicher Schreibweise folgendermassen lauten:

(21)
$$\varrho_i = \frac{1}{4\pi\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\delta_m^n} R_m^n (c_m^n \cos m\lambda + s_m^n \sin m\lambda), \quad \varrho_a = \frac{1}{4\pi\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{\delta_m^n} R_m^n (\gamma_m^n \cos m\lambda + \sigma_m^n \sin m\lambda)$$

(22)
$$S_i = \frac{b}{4\pi} \sum_{\epsilon_m} \frac{1}{\epsilon_m^n} R_m^n (c_m^n \cos m\lambda + s_m^n \sin m\lambda), S_a = -\frac{b}{4\pi} \sum_{1-\epsilon_m} \frac{1}{1-\epsilon_m^n} R_m^n (\gamma_m^n \cos m\lambda + \sigma_m^n \sin m\lambda)$$

liegt die vollständige Lösung der beiden am Beginn dieser Entwickelungen gestellten Aufgaben.

bearbender worden -- aut ferbigung stellte, eller Negunger ersjerte und

to the state of the second did the second did the second and the second second

Star and deal deal the action of the second second

all all a land the rest to the second and the state of the second second at the second second at the second second

II.

on the Marchael and Angeles of the State of

and the second of the second o

Vom ersten Beginn meiner Beschäftigung mit den im vorigen Abschnitte dargestellten Untersuchungen an war es mein begreiflicher Wunsch, die theoretischen Entwickelungen auf den thatsächlichen Zustand der erdmagnetischen Kraft anzuwenden. In diesem Wunsche wurde ich durch die Ergebnisse eines ersten, 1886 unternommenen Versuches nur bestärkt, da sich daraus für den allein berücksichtigten horizontalen Teil der Kraft zwar die Unvereinbarkeit der Beobachtungen mit der Hypothese eines Potentials zu ergeben schien, während doch wegen der verhältnismässigen Geringfügigkeit der auftretenden Widersprüche eine sichere Entscheidung auf der gewählten Grundlage unmöglich war. Ich hatte die Berechnung auf die von der deutschen Seewarte veröffentlichten, übrigens schon vorher von Quintus Icilius zu einer Potentialbestimmung benutzten Karten der Deklination und der Horizontalintensität für 1880,0 gestützt, Karten, deren Massstab nicht gestattete, bei der Entnahme der Funktionswerte über $0,001 \ cm^{-\frac{1}{2}} \ g^{\frac{1}{2}} \ s^{-1}$ bei H und 0,1 bei δ hinauszugehen. Als ich einige Jahre später Zeit fand, die Aufgabe wieder aufzunehmen, musste es mein Bestreben sein, für die endgültige Berechnung schärfere Werte zu benützen. Der schwierigen und zeitraubenden Arbeit, mir diese in genügender Vollständigkeit zu verschaffen, wurde ich durch einen auch in sachlicher Hinsicht sehr glücklichen Umstand enthoben. Herr Direktor Neumayer wünschte die von ihm zusammen mit H. Petersen durchgeführte Potentialberechnung einer kontrollierenden Wiederholung zu unterziehen, und er forderte mich nach dem Tode seines verdienstvollen Mitarbeiters auf, für diesen einzutreten. Ich zögerte keinen Augenblick, auf dieses Anerbieten einzugehen, das mir ein an Vollständigkeit und kritischer Durcharbeitung einzig stehendes Material 1) - ist es doch von einem seit Jahrzehnten thätigen Forscher in planmässiger Arbeit mit allen Mitteln persönlicher Beziehungen und an einer Zentralstelle wie der deutschen Seewarte gesammelt und an der Hand reicher Erfahrung bearbeitet worden - zur Verfügung stellte. Herr Neumayer erklärte sich

¹⁾ Ueber dieses giebt der Text zum "Atlas des Erdmagnetismus" (Abt. IV des Physikalischen Atlas von Berghaus) genaue Auskunft. — Einen guten Ueberblick gewährt ferner Dr. Neumayers Vortrag auf dem VIII. deutschen Geographentage zu Berlin (1889): "Ueber das gegenwärtig vorliegende Material für erd- und weltmagnetische Forschung". (Verh. d. VIII. d. Geogr.-T. zu Berlin, p. 33 ff.)

seinerseits bereitwillig damit einverstanden, dass ich die Neuberechnung nach der vervollständigten Theorie ausführte, wobei sich eine ausreichende indirekte Prüfung der früheren Rechnung als Nebenresultat gewinnen liess.

Herr Neumayer hat sich nicht darauf beschränkt, mir die Grundlage meiner Untersuchung zu liefern; ich verdanke ihm - und ich freue mich, meinem Danke hier öffentlich Ausdruck geben zu können — auch in anderen Beziehungen rege Förderung meiner Arbeit. Sein lebhaftes Interesse an ihrem Fortschreiten führte zu einer fast ununterbrochenen wissenschaftlichen Korrespondenz, die mir reiche Anregung und die Freude kritisch begründeter Zustimmung und Ermunterung brachte. Durch seine wiederholte Unterstützung wurde es mir ferner möglich gemacht, einen recht beträchtlichen Teil der Zahlenrechnung von einem Hülfsrechner ausführen zu lassen. Von den komplizierteren, nicht wohl jedem Rechner anzuvertrauenden Rechenarbeiten übernahm mein Vater, der mir schon bei früheren Gelegenheiten in dieser Weise wertvolle und zuverlässige Hülfe geleistet hatte, und dem ich auch an dieser Stelle dafür danken möchte, grosse Abschnitte, so dass schliesslich auf mich selbst kaum die Hälfte der rechnerischen Arbeit gekommen ist. Ohne diese Beihülfen würde sich der Abschluss der Arbeit noch wesentlich mehr gegen meine Erwartung verspätet haben, als es zu meinem Bedauern schon an und für sich der Fall gewesen ist.

Nachdem ich im Sommer 1892 die Rechnungsgrundlagen, über die weiterhin (S. 21, 22) berichtet werden soll, erhalten hatte, führte ich zunächst eine provisorische Entwickelung durch, die gleich allen bisher publizierten auf die Glieder der 4 ersten Ordnungen beschränkt war. Ueber die Ergebnisse dieser im Frühjahr 1893 abgeschlossenen Arbeit ist bereits an verschiedenen Stellen kurz berichtet worden. Auf der Herbstversammlung der "Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik" zu Münster (1893) hat Herr Neumayer einige Mitteilungen darüber gemacht, nachdem ich dies selbst kurz vorher vor der physikalischen Sektion der Naturforscherversammlung zu Nürnberg auf den von ihm angeregten Wunsch der Sektion gethan hatte. Einen ausführlicheren Bericht hatte er noch früher in eine von ihm an den Meteorologischen Kongress zu Chicago gesandte Abhandlung aufgenommen. Diese Abhandlung ist indessen auf unaufgeklärte Weise verloren gegangen.

Die folgenden Seiten enthalten den Bericht über eine seitdem ausgeführte erweiterte, bis zu den Gliedern 6. Ordnung gehende Darstellung. Dem Umstande entsprechend, dass es sich dabei um einen ersten Versuch auf einem neuen Wege handelt, ist bei der Diskussion der Resultate ein Hauptgewicht auf die Frage gelegt worden, welche Aufgaben sich daraus für die weitere

Forschung ergeben, und welche Bedingungen zu ihrer Förderung zu erfüllen sind. Wenn sich dabei gewisse praktische Forderungen, die von anderen Gesichtspunkten aus längst mit Nachdruck erhoben worden sind, von neuem als unabweisbar herausgestellt haben, so mag es gestattet sein, hier der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass dieses Ergebnis an seinem Teile dazu beitragen möge, die endliche Erfüllung jener Forderungen zu beschleunigen.

Bei der Anlage der numerischen Rechnung, zu deren Darstellung ich mich nun wende, war vor allem der Gesichtspunkt leitend, spätere Wiederholungen mit geänderter empirischer Grundlage nach Möglichkeit zu erleichtern. Zu diesem Zwecke wurden alle Operationen, so weit es sich thun liess, allgemein durchgeführt und die Beobachtungsdaten erst möglichst spät eingesetzt. (Es ergiebt sich dadurch der weitere Vorteil, dass die so abgeleiteten allgemeinen Lösungen auch zur Behandlung anderer geophysikalischer Probleme herangezogen werden können.) Zu demselben Zwecke wurde ferner die Berechnung der aus den analytischen Entwickelungen folgenden Werte der Kraftkomponenten für eine grosse Zahl von Punkten in Angriff genommen, eine Arbeit, die allerdings bisher nur zum kleinsten Teile vollendet werden konnte. Nach ihrer Beendigung wird es bei Wiederholungen und Verbesserungen der Arbeit auf Grund neuen Materials genügen, die Differenzen der beobachteten Werte gegen die bereits analytisch dargestellten und berechneten in die Rechnung einzuführen. Wie man dabei am zweckmässigsten zu verfahren habe, hat schon E. Schering in ausführlicher Darlegung gezeigt. 1)

Meine anfängliche Absicht, sämtliche Resultate und zur Erleichterung einer detaillierten Nachprüfung oder etwaiger Abänderungen auch den Gang der Rechnung in voller Ausführlichkeit zu veröffentlichen, habe ich aus äusseren Gründen vorläufig aufgeben müssen. Ich muss mich darauf beschränken, zunächst die Rechnungsgrundlagen und die wichtigsten Ergebnisse mitzuteilen; indessen hoffe ich, später noch die Möglichkeit einer ausführlicheren Publikation zu finden.

Die empirische Grundlage der in Nachstehendem mitgeteilten Entwickelungen ist, wie schon bemerkt wurde, dieselbe, auf der die Potentialberechnung von Neumayer und Petersen beruht. Sie besteht aus den bis zu den Gliedern 4. Ordnung fortgeführten trigonometrischen Reihendarstellungen der Kraftkomponenten X, Y, Z für die 25 äquidistanten Parallelkreise von $0^0, 5^0, 10^0 \dots 60^0$ nördlicher und südlicher geographischer Breite. Die Koeffizienten einer jeden

¹⁾ Vgl. darüber: K. Schering, Die Fortschritte unserer Kenntnisse vom Magnetismus der Erde. Geogr. Jahrbuch XV, 1891, p. 143 ff.

dieser 75 Reihen beruhen auf den 72 Funktionswerten, die nach den Originalkarten Dr. Neumayers in den Schnittpunkten des betreffenden Parallels mit
den Meridianen von 0°, 5°, 10°.....355° östl. Länge von Greenwich stattfinden. Die analytische Darstellung einer jeden Komponente ist daher schliesslich auf ihre als beobachtet anzusehenden Werte in 1800 Punkten gegründet,
die recht gleichmässig über die Erdoberfläche, allerdings mit Ausschluss der
polaren Gebiete, verteilt sind. Um eine Anschauung von diesen Werten zu
vermitteln, stelle ich in Tabelle V einige derselben zusammen.

Die Reihen sind nach der Bezeichnungsweise von Gauss in der Form

$$X = k_0 + k_1 \cos \lambda + K_1 \sin \lambda + \dots + K_4 \sin 4 \lambda$$

 $Y = l_0 + l_1 \cos \lambda + L_1 \sin \lambda + \dots + L_4 \sin 4 \lambda$
 $Z = m_0 + m_1 \cos \lambda + M_1 \sin \lambda + \dots + M_4 \sin 4 \lambda$

angesetzt; ihre Koeffizienten habe ich in den Tabellen VIa, b, c zusammengestellt. Als Einheit ist hier wie bei allen weiteren Angaben

$$0.1^5 cm^{-\frac{1}{2}} g^{\frac{1}{2}} s^{-1}$$

d. i. der 10000. Teil der Gaussischen Einheit benützt worden.

Nun handelt es sich darum, diese Koeffizienten oder vielmehr (S. 9) die Produkte

$$\alpha k_m^n \sin v$$
, $\alpha K_m^n \sin v$; $\beta l_m^n \sin v$, $\beta L_m^n \sin v$; γm_m^n , γM_m^n

nach Kugelfunktionen zu entwickeln. Die Verteilung der gegebenen Werte auf willkürlich gewählte Parallelkreise macht, zumal da deren Reihe in weitem Abstande von den Polen endigt, die Anwendung der Neumann'schen Methode¹) zur Entwickelung nach diesen Funktionen zwar nicht unmöglich, aber doch unvorteilhaft. Ich hätte, um dies zu vermeiden und jene Methode in ihrer einfachsten Gestalt anwenden zu können, auf die kartographische Darstellung der Elemente zurückgehen und ihre Werte auf einer Anzahl von neuen, dementsprechend gewählten Breitenkreisen bestimmen müssen. In der That glaube ich auch eine nachträgliche Durchführung dieser Untersuchung für zweckmässig halten zu sollen. Im vorliegenden Falle wäre indessen auf diesem Wege ein wesentlicher Vorteil verloren gegangen. Dadurch, dass die von

TOUR GOOD FINED A RESERVE DELICE OF THE PARTY OF THE PART

¹⁾ Astronomische Nachrichten, Band 15, p. 313 und Mathematische Annalen, Band 14, p. 567 (Wiederabdruck). — Eine kurze Formelzusammenstellung (ohne Begründung) habe ich in meiner ersten Abhandlung (Aus dem Archiv der deutschen Seewarte, 1889, Nr. 3) gegeben. — Eine ausführlichere Darstellung mit Hülfstafeln gab Seeliger in den Sitz.-Berichten d. math.-phys. Klasse der Akad. d. Wiss. zu München, 1890, p. 499.

00076823

Neumayer und Petersen nach der vereinfachten Theorie durchgeführte Rechnung auf genau denselben empirischen Zahlenwerten beruht, wie die hier nach der vervollständigten Theorie vorgenommene, wird die Möglichkeit gewonnen, den Einfluss der veränderten Behandlungsweise in aller Schärfe zu beobachten. Bei den nicht unbeträchtlichen Differenzen zwischen Beobachtung und Rechnung hätte dagegen die Vergleichbarkeit der in beiden Fällen erhaltenen Ergebnisse bei der Verwendung verschiedener Parallelkreise in dem einen und dem andern Falle selbst dann in gar nicht zu übersehender Weise leiden müssen, wenn, wie hier, die zugrunde liegende kartographische Darstellung dieselbe blieb.

Ich habe deshalb in der üblichen Weise die Methode der kleinsten Quadrate zur Ableitung der Entwickelung benützt. Es sei $f_{m,i}$ irgend einer der Koeffizienten

 $\alpha_i \, k_{m,\,i} \, \sin v_i, \, \alpha_i \, K_{m,\,i} \, \sin v_i, \, \beta_i \, l_{m,\,i} \, \sin v_i, \, \beta_i \, L_{m,\,i} \, \sin v_i, \, \gamma_i \, m_{m,\,i}, \, \gamma_i \, M_{m,\,i}$ wobei der die Werte 1, 2 . . . 25 durchlaufende Index i die zu den verschiedenen Parallelkreisen

$$u_1 = 30^\circ$$
, $u_2 = 35^\circ$, ... $u_{25} = 150^\circ$

gehörigen Werte unterscheidet, und es bezeichne F_m^n den entsprechenden unter den Koeffizienten B_m^n , C_m^n , D_m^n , E_m^n , j_m^n , k_m^n . Das System der Fehlergleichungen lautet dann

$$f_{m,i} = \sum_{n=m}^{n=m+\nu} F_m^n \cdot R_m^n (\cos v_i) \qquad i = 1, 2 \dots 25$$

Die Auflösung dieses Systems hängt noch von der Gewichtsfestsetzung ab. Man könnte daran denken, diejenigen Gleichungen, die sich auf verhältnismässig schlecht bekannte Gegenden, z. B. auf höhere südliche Breiten, beziehen, mit geringerem Gewichte einzuführen als die andern. Es ist aber leicht einzusehen, dass man Gefahr laufen würde, auf diesem Wege den Gewinn einer Herabsetzung der zufälligen Fehler mit einer systematischen Verfälschung der Resultate zu erkaufen. Die Frage muss indessen noch von einem andern Gesichtspunkt aus betrachtet werden. Die Grössen, deren Reihenentwickelung gesucht wird, sind, wenn der Einfachheit halber die Abplattung der Erde unberücksichtigt bleibt, $X \sin u$, $Y \sin u$ und Z — die beobachteten Werte sind dagegen diejenigen von X, Y, Z. Die Ausgleichung wäre demnach eigentlich so vorzunehmen, dass diese letzteren möglichst genau dargestellt werden, während dies bei der Annahme gleichen Gewichts der Fehlergleichungen in Bezug auf die erstgenannten geschieht. Hiernach dürfte das Gewicht nur bei

der Entwickelung von Z als konstant eingeführt werden, während es bei der von X sin u und Y sin u dem Quadrate des Sinus der Breite umgekehrt proportional zu setzen wäre. Nun kommt aber andrerseits in Betracht, dass infolge der mit wachsender Breite abnehmenden Länge der Parallelkreise die äquatorealen Gegenden thatsächlich nicht so dicht angeordnete, beobachtete Werte in die Rechnung einführen, wie die weiter polwärts gelegenen Gebiete — von den ganz ausfallenden Polargebieten natürlich abgesehen. Um diese verschiedene Dichtigkeit auszugleichen, mit andern Worten, um den einzelnen Zonen einen ihrer Fläche entsprechenden Einfluss auf das Resultat zu gewähren, hätte man offenbar, und zwar bei allen drei Komponenten, das Gewicht jeder Gleichung noch mit sin u zu multiplizieren. Die Kombination dieser verschiedenen Rücksichten würde also dahin führen, bei der Entwickelung von X sin u und Y sin u das Gewicht mit (1: sin u) anzusetzen, bei der von Z dagegen umgekehrt sin u dafür zu wählen.

Bedenkt man nun aber, dass bei der verhältnismässig sehr grossen Zahl von überschüssigen Gleichungen die Wahl der Gewichte nur geringen Einfluss auf das Resultat, soweit dies von den zufälligen Fehlern berührt wird, haben kann, zumal da das Verhältnis der extremen Gewichtswerte nur das von 1:2 ist, so erscheint es durchaus gerechtfertigt, die Frage nach praktischen Rücksichten zu entscheiden. Diese aber sprechen dafür, allen Gleichungen dasselbe Gewicht zu geben. Es wird dadurch nicht nur die Herstellung der Normalgleichungen etwas bequemer gemacht, sondern vor allem wird dabei die Auflösung für alle drei Komponenten dieselbe, während sonst zwei Systeme von Normalgleichungen — das eine für $X \sin u$ und $Y \sin u$, das andere für Z aufgestellt und gelöst werden müssen. Für dieses Verfahren lässt sich schliesslich noch ein sachlicher Rechtfertigungsgrund anführen. Es handelt sich bei der vorliegenden Aufgabe in letzter Linie gar nicht darum, den beobachteten und als fehlerhaft betrachteten Zustand nach einer theoretisch vorgezeichneten, geschlossenen Formel auszugleichen, sondern darum, den Zustand so, wie er beobachtet worden ist, in einer willkürlich abgebrochenen Entwickelung und daher nur angenähert analytisch darzustellen. So lange daher die verbleibenden Differenzen nicht unter den Betrag der vermutlichen Unsicherheit der Beobachtungen herabgehen, hat man sie durch Weiterführung der Entwickelung zu verkleinern. Die Aufgabe wird dadurch wenigstens näherungsweise zu einer bestimmten, bei der die Gewichtsfestsetzung überhaupt gleichgültig ist. Am deutlichsten tritt dieser Sachverhalt hervor, wenn man sich die Beobachtungen in genügender Dichte über die ganze Erdoberfläche verteilt denkt. In diesem Falle, wo die einzelnen Koeffizienten unabhängig von einander durch die bekannten Integrale dargestellt werden, tritt die Aufgabe der Ausgleichung ganz in den Hintergrund. Dem alsdann anzuwendenden Verfahren entspricht es nun offenbar hier, wenn Z in derselben Weise behandelt wird wie $X \sin u$ und $Y \sin u$ oder, um wieder zu der genaueren Darstellung zurückzukehren, γZ so wie $\alpha X \sin v$ und $\beta Y \sin v$. Diesen Ueberlegungen gemäss habe ich bei der Bildung der Normalgleichungen alle Gleichungen mit demselben Gewicht eingeführt.

Was die Begrenzung der Entwickelung betrifft, so hängt die endgültige Entscheidung darüber natürlich davon ab, wie grosse Abweichungen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten man noch als zulässig betrachten will. Vorläufig schien es am zweckmässigsten, einen Versuch mit einer bis zu den Gliedern 6. Ordnung ausgedehnten Entwickelung zu machen, da einerseits nach den bisherigen Erfahrungen die Glieder der ersten 4 Ordnungen unzweifelhaft nicht genügen, andrerseits der mit der wachsenden Gliederzahl schnell steigende Umfang der Rechnung zu möglichster Beschränkung mahnt. (Nur eine Ordnung weiter zu gehen, wäre eine halbe Massregel gewesen, weil infolge der symmetrischen Verteilung der 25 benützten Parallelkreise die Glieder gerader und diejenigen ungerader Ordnung unabhängig von einander gefunden werden.)

In formaler Hinsicht wäre von der Begrenzung der Entwickelung zu verlangen, dass sie durch eine blosse Koordinatentransformation nicht geändert werde. Daraus würde nun, wie der entwickelte Ausdruck für die Kugelfunktion P^n ($\cos v_1 \cos v_2 + \sin v_1 \sin v_2 \cos (\lambda_1 - \lambda_2)$) erkennen lässt, folgen, dass man die Reihe mit denjenigen Gliedern, deren Indices m und n übereinstimmen, abschliessen müsse. Da indessen bei der, wie bisher so auch hier befolgten Methode, welche zuerst zur Entwickelung auf den einzelnen Parallelkreisen führt, die von den verschiedenen Vielfachen der geographischen Länge λ abhängigen Teile der darzustellenden Funktion unabhängig von einander erhalten werden, so unterliegt es keinem Bedenken, den Maximalwert von m ohne Rücksicht auf den von n festzusetzen, abgesehen von der selbstverständlichen Bedingung, dass in jedem einzelnen Gliede m nicht grösser als n sein darf.

Ich habe die Entwickelung bis zu den Werten m=4, n=6 (bei $\alpha X \sin v$ also n=7) ausgedehnt. Die dann noch übrig bleibenden Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten entfallen, wie sich später zeigen wird, zu ungefähr gleichen Teilen auf die für m>4 und die für n>6 anzusetzenden Glieder, so dass die beiden Grenzen in praktischer Hinsicht als gleichwertig gelten dürfen.

Da, wie bemerkt, eine vollständige Wiedergabe der Rechnung gegenwärtig unterbleiben muss, so verzichte ich in der Hoffnung, das Versäumte später nachholen zu können, auch auf eine auszugsweise Mitteilung und wende mich sofort zu den Ergebnissen.

Aus den Normalgleichungen, die in der zuvor angegebenen Weise gebildet worden sind, ergeben sich die Koeffizienten der Reihen für $\alpha X \sin v$, $\beta Y \sin v$ und γZ , die (der Kürze halber unter der gemeinsamen Bezeichnung p_m^n , q_m^n) in den beiden mit IV bezeichneten und in der letzten Spalte der Tabelle VII zusammengestellt sind. (Die Bedeutung der Zahlen in den Reihen I, II, III wird weiterhin, S. 38, erläutert werden.) Dieselben Zahlen finden sich, auf Ganze der hier benutzten Einheit abgerundet und in etwas geänderter, leicht verständlicher Anordnung in Tabelle VIII nochmals vor. Dass einige der darin auftretenden Zahlen noch Dezimalstellen enthalten, ist eine Folge der Bedingungsgleichungen (6). Die in VIII zusammengestellten Werte sind als endgültig angenommen und allen weiteren Rechnungen zugrunde gelegt worden.

Dass die durch die Abrundung eingeführte kleine Abweichung von den zufolge der Ausgleichung besten Werten die Fehlerquadratsumme nur ganz unmerklich vergrössert, und dass daher die Abrundung durchaus zulässig ist, braucht nicht begründet zu werden; dagegen könnte man sie für zwecklos halten, da der weiteren Rechnung daraus kein nennenswerter Vorteil erwächst. Von diesem Standpunkte aus wären die in Tabelle VII angegebenen, unveränderten Werte mit Recht vorzuziehen. Die von mir gewählte Abänderung hat indessen einen andern Sinn. Es sollen die in VIII zu findenden Zahlen ohne Dezimalstellen nicht als Näherungswerte gelten, die eben nur um eine Stelle mehr als diejenigen in VII abgerundet sind, sie sollen vielmehr scharfe Werte vorstellen, die einen bestimmten möglichen, dem wirklichen allerdings nur näherungsweise entsprechenden Zustand des erdmagnetischen Feldes exakt definieren. Die mit zwei Dezimalstellen versehenen Zahlen tragen zur Definition dieses Zustandes nichts bei, denn sie folgen vermöge der Bedingungsgleichungen (6) aus den andern Koeffizienten. Ihre hier angegebenen Werte sind daher als abgerundete anzusehen, die jederzeit mit Hülfe jener Gleichungen noch genauer berechnet werden können. (Bei der numerischen Berechnung von X aus der Reihe für αX sin v ist es in der Nähe der Pole unzweckmässig, an den Polen selbst unmöglich, die Summe

$$\frac{1}{\alpha \sin v} (B_0^0 R_0^0 + B_0^1 R_0^1 + B_0^2 R_0^2 + B_0^3 R_0^3 \ldots) \, \, \text{oder} \, \, B_0^0 \frac{R_0^0}{\alpha \sin v} + B_0^1 \frac{R_0^1}{\alpha \sin v} + \ldots$$

zu bilden, da sie für $v=0^{\circ}$ und für $v=180^{\circ}$ in einen unbestimmten Ausdruck übergeht. Ebenso verhält es sich bei der Berechnung von Y. Zur

00076823

Vermeidung dieses Uebelstandes hat man die Reihe mit Rücksicht auf die zwischen den Koeffizienten bestehenden Bedingungsgleichungen (die eben die Existenz einer eindeutig bestimmten Horizontalkraft an jedem Pole ausdrücken) umzuformen, was in verschiedener Weise geschehen kann. Am bequemsten, weil dann, gleichgültig wie weit die Entwickelung geführt wird, stets dieselben Funktionentafeln benutzt werden können, ist es, die Form

$$B_0^2 \frac{R_0^2 - \beta_0^2 R_0^0}{\alpha \sin v} + B_0^3 \frac{R_0^3 - \beta_0^3 R_0^1}{\alpha \sin v} + B_0^4 \frac{R_0^4 - \beta_0^4 R_0^0}{\alpha \sin v} + B_0^5 \frac{R_0^5 - \beta_0^5 R_0^1}{\alpha \sin v} + \dots$$

$$\text{mit } \beta_0^{2n} = \alpha_0^{2n} : \alpha_0^0 = \alpha_0^{2n}, \ \beta_0^{2n+1} = \alpha_0^{2n+1} : \alpha_0^1 = \alpha_0^{2n+1} : \sqrt{3}$$

zu wählen. Mit Rücksicht hierauf habe ich bei m=0 und dann der Gleichförmigkeit halber auch bei den übrigen Werten von m die beiden ersten Koeffizienten (mit n=m und n=m+1) als Funktionen der folgenden angesetzt. Von andern Gesichtspunkten aus könnte man es vorziehen, umgekehrt die letzten Koeffizienten jeder Reihe durch die vorhergehenden auszudrücken; indessen ist es natürlich eine Frage von untergeordneter Bedeutung, wie man verfahren will.)

Dieselben Erwägungen, die (S. 22, 23) zur Festsetzung der Gewichte der Gleichungen führten, lassen die Ableitung mittlerer oder wahrscheinlicher Fehler der berechneten Koeffizienten (in VIII) aus den noch zwischen Beobachtung und Rechnung vorhandenen Differenzen bedeutungslos erscheinen, so lange diese Differenzen durch eine etwas weitere Ausdehnung der Reihenentwickelung noch wesentlich erniedrigt werden können. Ich ziehe es vor, die Differenzen selbst einzeln anzugeben, um ein klares Urteil über die Brauchbarkeit der gewonnenen analytischen Darstellung möglich zu machen, dann aber eine blosse Schätzung der mittleren Fehler der Koeffizienten auf Grund der für die beobachteten Werte etwa anzusetzenden durchschnittlichen Unsicherheit vorzunehmen. Beide Angaben vereint werden erkennen lassen, ob und welche Erweiterungen der Reihenentwickelung bei dem gegenwärtigen Stande unserer empirischen Kenntnisse nötig sind, wenn eine diesen angepasste Schärfe der Darstellung erzielt werden soll, und welche weiteren Verbesserungen nur durch neue, sichere Beobachtungen gewonnen werden können.

In den Tabellen XIa, b, c finden sich die aus den Zahlen der Tabelle VIII folgenden Werte der Koeffizienten k, K, l, L, m, M von 5 zu 5 Grad für das ganze Bereich von $v=0^{\circ}$ bis $v=180^{\circ}$. Die Zahlen sind, damit spätere Neuberechnungen auf scharfe Differenzwerte gestützt werden können, bis auf Zehntel der hier angewandten Einheit angegeben. Die Abweichungen

ASSESSED BY A SECRETARION SEED BELLEVISHED

dieser berechneten Werte von den in VIa, b, c verzeichneten beobachteten finden sich, der leichteren Uebersichtlichkeit halber auf Ganze abgerundet, in den folgenden Tabellen XIIa, b, c. Alle diese, wie die weiterhin auftretenden Differenzen sind so gebildet, dass sie den Ueberschuss der beobachteten über die berechneten Werte darstellen. Sie bezeichnen also den noch nicht durch den analytischen Ausdruck wiedergegebenen Teil der Beobachtungsresultate und sind mit diesen gleichartig. Irgend welche Verbesserungen der letzteren dürfen ohne weiteres als Korrektionen der Differenzen angesehen werden, und wenn diese ganz oder teilweise analytisch dargestellt werden, so sind die dabei erhaltenen Resultate unverändert dem bereits ermittelten Ausdrucke hinzuzufügen.

Die als beobachtet bezeichneten Werte der Koeffizienten k, K u. s. w. sind dies nur mittelbar, im Gegensatz zu den aus der Kugelfunktionenreihe abgeleiteten. Beobachtet im eigentlichen Sinne sind hier diejenigen Zahlen zu nennen, die den zugrunde gelegten empirischen Thatbestand definieren, also die Werte von X, Y, Z in den zu Anfang bezeichneten 1800 Punkten der Erdoberfläche. (Dass auch diese bereits mehr oder weniger das Resultat einer Bearbeitung der unmittelbaren Messungsergebnisse sind, kommt für die vorliegende Arbeit nicht in Betracht.) Ein abschliessendes Urteil kann daher nur auf die Vergleichung der an diesen 1800 Punkten nach Dr. Neumayers Karten ermittelten Werte mit den aus der Darstellung in VIII folgenden gegründet werden. Dieser Vergleichung dienen die Tabellen in XIVa, b, c, in denen jedoch nur die schon in Tafel V auftretenden 156 Punkte — von 10° zu 10° in Breite, von 30° zu 30° in Länge — berücksichtigt worden sind, was zur Gewinnung eines Ueberblickes ausreicht. Jede dieser Differenzentafeln zerfällt in drei Abschnitte. Der erste, mit d' überschriebene, enthält diejenigen Differenzen, welche durch die Beschränkung der trigonometrischen Reihenentwickelungen auf die Glieder der ersten vier Ordnungen entstehen, mit andern Worten den Ueberschuss der beobachteten Werte (in V) über die nach den Tabellen VIa, b, c berechneten. Unter der Bezeichnung d' finden sich die durch die Begrenzung der Entwickelung nach Kugelfunktionen herbeigeführten Differenzen, die sich ohne weiteres aus den Zahlen der Tafeln XII a, b, c ergeben. Die Summe beider Differenzen, also der Gesammtunterschied von Beobachtung und Rechnung, bildet endlich den dritten Abschnitt, 1, der Tabellen.

Um die hier mitgeteilten Zahlen würdigen zu können, muss man sich erinnern, dass, in derselben Einheit gemessen, die durchschnittliche Intensität der erdmagnetischen Totalkraft etwa gleich 50000 (mit den Extremwerten

osla Jacon

neb astan

26 000 und 70 000) ist, während die Durchschnittswerte von X, Y, Z, vom Vorzeichen abgesehen, zu ungefähr 30 000, 6000, 40 000 angesetzt werden können. Ein unmittelbarer Vergleich mit den bei früheren Potentialberechnungen erhaltenen Abweichungen ist nicht möglich, weil diese (wenigstens soweit sie veröffentlicht worden sind) immer nur bis zu den Kugelfunktionen 4. Ordnung ausgedehnt wurden. Mittelbar lässt sich indessen ein Vergleich mit Hülfe meiner zu Anfang erwähnten provisorischen Rechnung, die ebenfalls bis zur 4. Ordnung ging, gewinnen. Bei dieser waren die Differenzen A durchschnittlich fast 1,8 mal so gross, wie die hier mitgeteilten bei der definitiven Berechnung, obgleich bei diesen nur der Bestandteil A" eine Verminderung erfahren hat. Es betragen nämlich die mit Hülfe der Fechner'schen Formel aus dem Durchschnitte ihrer 156 absoluten Werte näherungsweise berechneten mittleren Differenzen

bei			X		Y	Z
nach der	1.	Rechnung	土	762	610	1331
nach der	2.	Rechnung	+	336	434	819.

Die Einführung der Kugelfunktionen 5. und 6. (bei a X sin v derjenigen 6. und 7.) Ordnung hat also eine wesentliche Verbesserung der Resultate zur Folge gehabt. Von den früher ausgeführten Berechnungen ist die Erman-Petersen'sche am besten geeignet, zum Vergleiche herbeigezogen zu werden, weil sich nur bei dieser die Differenzen zwischen Beobachtung und Rechnung in Bezug auf die Kraftkomponenten angegeben finden.1) Allerdings beziehen sich diese Differenzen auf andere Punkte, als die hier gewählten, und ihre Anzahl ist überdies geringer (90 gegen 156); indessen dürfte dieser Umstand an sich die Vergleichbarkeit der beiderseitigen Ergebnisse nur wenig beeinträchtigen. Wichtiger ist es, dass bei Erman und Petersen die 9 benutzten Koeffizienten jeder trigonometrischen Reihe nur aus den Elementen an den nachher bei der Prüfung berücksichtigten 9 Punkten des betreffenden Parallelkreises abgeleitet worden sind, so dass die hier mit d' bezeichneten Differenzen dort verschwinden, weshalb die Gesamtdifferenzen bei E.-P. verhältnismässig zu klein erscheinen. Nun beträgt nach der Angabe auf S. 24 der genannten Publikation der wahrscheinliche Fehler eines berechneten Wertes in konventionellen Einheiten

term that the state incomes and the state of the state of

¹⁾ A. Erman und H. Petersen: Die Grundlagen der Gaussischen Theorie und die Erscheinungen des Erdmagnetismus im Jahre 1829. Berlin 1874. S. 24.

 \pm 21,41 15,98 29,10,

woraus sich der mittlere Fehler in der hier benutzten Einheit durch Multiplikation mit 34,941:0,6745

bei X Y Z zu ± 1109 828 1507 ergiebt.

Diese Differenzen sind durchschnittlich 1,3 mal so gross wie die vorher angegebenen, entsprechenden meiner provisorischen Rechnung und 1,9 mal so gross wie die eigentlich mit ihnen zu vergleichenden Differenzen d'. Wie weit dieses für die letztere Berechnung günstige Ergebnis davon herrührt, dass das neue Beobachtungsmaterial besser als das alte ist, liesse sich selbst durch eine eingehende Untersuchung kaum mit Sicherheit feststellen. Zum Teil beruht die Ueberlegenheit der neuen Berechnung unzweifelhaft darauf, dass bei ihr jede Komponente selbständig dargestellt worden ist (natürlich unter Berücksichtigung der X und Y verknüpfenden, rein analytischen, nicht physikalischen Bedingungsgleichungen), während nach der alten Methode alle drei Komponenten auf Grund gewisser physikalischer Hypothesen (S. 3) durch eine gemeinsame Ausgleichung gefunden werden. Dort ist daher auch die Zahl der zu bestimmenden Konstanten, auf denen die Darstellung beruht, 3 mal so gross wie hier. Die neue Rechnung muss also schon dann geringere Differenzen ergeben, wenn diese nur auf den Beobachtungsfehlern beruhen; in höherem Grade muss dies der Fall sein, wenn die theoretischen Voraussetzungen der früheren Rechnung (die Hypothese der Existenz eines Potentials ausschliesslich innerer Kräfte) nicht erfüllt sind. Die daraus entspringenden Widersprüche zwischen den nicht in die angenommene Form passenden Werten der drei Komponenten müssen in die Schlussdifferenzen eingehen, so dass diese durch keine noch so weite Ausdehnung der Reihen unter einen gewissen Betrag herabgedrückt werden können. Im Gegensatze hierzu können die Differenzen bei selbständiger Berechnung der einzelnen Komponenten, so wie sie in XIV a, b, c erscheinen, beliebig klein gemacht werden. Die Ueberlegenheit der neuen Methode über die alte muss daher um so stärker hervortreten, je mehr Glieder in der Entwickelung berücksichtigt werden. Die bisherigen Erfahrungen entsprechen dieser Erwartung und liefern so bereits einen indirekten Beweis dafür, dass die physikalischen Voraussetzungen der alten Theorie nicht streng erfüllt sein können. Während nämlich, wie kurz zuvor (S. 28) schon bemerkt wurde, die Hinzunahme der Kugelfunktionen 5. und 6. Ordnung bei der vorliegenden Berechnung eine wesentliche Herabminderung der Differenzen bewirkte, war die gleiche Erweiterung der Entwickelung bei Dr. Neumayers Potentialberechnung (der einzigen, die bisher über die 4. Ordnung hinausgeführt worden ist) ohne wesentlichen Nutzen¹), obgleich dabei obendrein die von 5λ und 6λ abhängigen Glieder berücksichtigt und so, im Gegensatze zur vorliegenden Rechnung, die Differenzen Δ'

herabgesetzt wurden.

Ist hiernach das Ergebnis der neuen Rechnung relativ als günstig zu bezeichnen, so ist es doch für sich betrachtet noch keineswegs befriedigend. Die in den Tabellen XIVa, b, c zusammengestellten Differenzen sind offenbar noch wesentlich grösser als die möglichen Fehler der beobachteten (d. h. den Karten entnommenen) Werte, für die es freilich kaum möglich ist, eine auch nur einigermassen sichere Schätzung zu gewinnen. Es liegt daher der Gedanke nahe, die Entwickelung noch fortzusetzen. Indessen sprechen auch manche Erwägungen wenigstens gegen eine beträchtliche Erweiterung der Reihen und lassen es nützlich erscheinen, schrittweise vorzugehen und so auf Grund der successiven Resultate die zweckmässigste Grenze der Entwickelung empirisch festzustellen. Je grösser man die Anzahl der berücksichtigten Reihenglieder und damit die der zu bestimmenden Unbekannten wählt, desto stärker wird im allgemeinen der Einfluss der Beobachtungsfehler auf die gesuchten Koeffizienten. Die Fortsetzung der Entwickelung wird daher zwar eine immer bessere Anschmiegung an die in endlicher Zahl vorhandenen Beobachtungswerte bewirken, schliesslich aber zu einer weniger sicheren, in Zwischenpunkten immer schlechteren Gesamtdarstellung führen. Dies ist in besonders hohem Grade bei der hier benutzten Rechnungsgrundlage zu befürchten, die zwei grosse, von Beobachtungen ganz freie Gebiete, die beiden Polarkalotten von 30° sphärischem Radius, enthält. Eine zu weitgehende Schärfe in der Darstellung der für die Zone von 60° nördl. bis 60° südl. Breite gegebenen Werte würde eine für die Polargebiete gänzlich unbrauchbare Entwickelung liefern können. Hierzu kommt nun die Erwägung, dass eine nahezu vollkommene Darstellung der beobachteten Werte durch einen analytischen Ausdruck nicht einmal die wichtigste Aufgabe ist. Gerade weil diese Aufgabe so, wie sie hier gefasst ist, theoretisch mit beliebiger Annäherung gelöst werden kann, während die Regellosigkeit der Erscheinung im Einzelnen eine schnelle Konvergenz der Reihen oder einen gesetzmässigen Zusammenhang ihrer Koeffizienten ausschliesst, so ist die wirkliche Ausführung der Reihen-

sten Theorie micht stenge erfallt sein konnen. Nahrend mindell wie kerre

¹⁾ Neumayer, Ueber erdmagnetische Landesvermessung. Vortrag, gehalten vor der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Bremen. 1890.

entwickelung bis zu Gliedern sehr hoher Ordnung theoretisch ohne Interesse und praktisch wertlos. Die Hauptbedeutung der analytischen Darstellung liegt darin, dass sie allein eine zuverlässige Grundlage für die physikalische Theorie des Phänomens abgeben kann, dass z. B. ohne sie schon die erste Frage, die nach dem räumlichen Ursprunge der Kraft, unbeantwortet bleiben muss. Die analytische Darstellung leistet dies, indem sie das regellose Gesamtbild der Erscheinung in eine (unendliche) Summe von regelmässig gebildeten Bestandteilen zerlegt, die im allgemeinen als partikuläre Lösungen der fundamentalen Differentialgleichungen des Problems einzeln betrachtet werden können. Es ergiebt sich daraus, dass die aus der Reihenentwickelung zu ziehenden Schlüsse von der Ausdehnung der Reihen unabhängig sind. Daher kommt es nicht sowohl auf die Anzahl als vielmehr auf die möglichst genaue Bestimmung der zu berechnenden Reihenglieder an, und als wichtigste Aufgabe muss gegenwärtig eine wesentlich verschärfte Ermittelung der ersten Koeffizienten der Reihen bezeichnet werden. Freilich ist hier, wo infolge der Verteilung der beobachteten Werte jede Normalgleichung mehrere unbekannte Koeffizienten enthält, so dass diese nicht unabhängig von einander erhalten werden, beides nicht vollkommen zu trennen. Bis zu einer gewissen, nicht von vornherein ersichtlichen Grenze wird daher nur die Erweiterung der Reihenentwickelung zu einer schärferen Bestimmung der einzelnen, insbesondere der ersten und wichtigsten Koeffizienten führen. Eine durchaus selbständige Berechnung jedes Koeffizienten und damit die Möglichkeit, seinen Wert frei von jeder nicht auf Beobachtungsfehler allein zurückgehenden Unsicherheit zu erhalten, setzt die Kenntnis der darzustellenden Funktionen (der Kraftkomponenten) auf der ganzen Erdoberfläche voraus, die daher hier von neuem als wichtiges Desiderat erscheint.

In den vorausgehenden Betrachtungen ist ausschliesslich die rein analytische, durch die Zahlen der Tabelle VIII eindeutig definierte Darstellung der empirisch gegebenen Kraftverteilung behandelt worden. Mit Hülfe der im ersten Abschnitte zusammengestellten Formeln ist nun daraus eine zweite, damit äquivalente Darstellung abzuleiten, die, in ihrer Form nach physikalischen Gesichtspunkten bestimmt, der Untersuchung der Ursachen dieser Kraftverteilung zur Grundlage dienen kann. Zu diesem Zwecke sind zunächst aus $\alpha X \sin v$ und $\beta Y \sin v$ die Funktionen U und W zu entwickeln. Man findet ihre Koeffizienten in Tabelle IX, die ausserdem diejenigen von (V:b), d. i. dem arithmetischen Mittel von U_0 und W_0 , enthält. Der Umstand, dass U und W nicht übereinstimmen, drückt nach dem früher Gesagten aus, dass die horizontalen Kräfte

ndrainoisoltimat valetoram un michallorante bottotol proporto michallo michallo de la michallo de la contractora del la contractora del la contractora de la contractora de la contractora del la contractora de la contractora de la contractora del la contracto

in der Erdoberfläche nicht vollständig auf ein Potential zurückgeführt werden können. Nimmt man als Ursache davon eine elektrische Strömung an, welche die Erdoberfläche (senkrecht) durchdringt, so lässt sich deren auf die Flächeneinheit bezogene Intensität, mit andern Worten ihre Stromdichte i mit Hülfe der Formel (14) aus der Differenz (W - U) berechnen. Für die damit nahezu proportionale Grösse αβbi ergiebt sich eine geschlossene Entwickelung, deren Koeffizienten in Tabelle X zu finden sind. Der mittlere Betrag von bi auf der ganzen Erdoberfläche folgt daraus zu etwa 110, d. h. 0,0011 cm-1 g1 s-1. Da b, der Polarradius der Erde, 6,356.108 cm beträgt, so ergiebt sich für i der Mittelwert $1,7.10^{-12}$ cm $^{-\frac{3}{2}}$ $g^{\frac{1}{2}}$ s $^{-1}$ oder ungefähr $1,7.10^{-11}$ Ampère: cm². (Natürlich sind hier quadratische Mittel gemeint, da die algebraische Summe der Strömung und damit das einfache Mittel ihrer Intensitätswerte verschwindet.) Auf eine Fläche von einem Quadratkilometer kommt daher durchschnittlich ein Strom von 1/6 Ampère. Die physikalische Möglichkeit einer so schwachen Strömung, die sich sogar bereits durch mechanische Konvektion elektrischer Ladungen erklären liesse, ist wohl nicht zu bestreiten; von dieser Seite liegt kein Grund vor, die Thatsächlichkeit der Differenz von W und U zu bezweifeln. Eine andere Frage, die weiterhin noch untersucht werden muss, ist es, ob nicht die Unsicherheit der Koeffizienten von U und W so gross ist, dass der Unterschied beider Funktionen illusorisch wird.

Aus dem Potential V des möglichst gross gewählten Hauptteils der horizontalen Kräfte und aus der vertikalen Komponente Z ergeben sich nun weiter nach den Formeln 15/18 die Potentiale V_i und V_a der innern und der äussern Agentien. Die Koeffizienten beider oder vielmehr der damit proportionalen Grössen $(V_i:b)$ und $(V_a:b)$ sind in Tabelle X angegeben. Man sieht, dass V_a in der That, wie sich nach den früheren Potentialberechnungen voraussehen liess, sehr klein ist; sein Mittelwert beträgt nur ungefähr $^1/40$ desjenigen von V_i . Auch hier bleibt natürlich die Sicherheit der Resultate noch zu untersuchen. Sehe ich davon zunächst ab, so kann ich das rechnungsmässige Ergebnis in folgender Weise aussprechen.

Die empirisch festgestellte Verteilung der erdmagnetischen Kräfte in der Erdoberfläche, wie sie durch Dr. Neumayers Karten für den Augenblick 1885,0 dargestellt wird, beruht zwar vorwiegend auf Ursachen, deren Sitz im Erdinnern liegt, kann aber nicht ausschliesslich auf solche zurückgeführt werden. Ein kleiner Teil der Kraft (etwa ½0 des ganzen Betrages) ist Ursachen ausserhalb der Erdoberfläche zuzuschreiben; ein weiterer, noch etwas grösserer Teil (und zwar speziell der horizontalen Komponente) deutet auf elektrische Strömungen hin, welche diese Fläche durchdringen.

Die beiden durch die Zahlen in VIII einerseits, durch die in X andererseits definierten Darstellungen des magnetischen Zustandes der Erde sind, wie schon bemerkt wurde, gleichwertig; unter Beachtung der früher erwähnten Nebenbedingungen (S. 10) kann aus jeder von ihnen die andere abgeleitet werden. Es ist danach selbstverständlich, verdient aber trotzdem hervorgehoben zu werden, dass die in X gegebene Darstellung von den beobachteten Werten nur um die bereits früher (bei VIII) vorhandenen Differenzen, die in XII und XIV zum Ausdruck kommen, abweicht. Es ist daher prinzipiell möglich, die Darstellung durch Vi, Va und i dem wirklichen, empirisch festgestellten Zustande beliebig nahe zu bringen.

Aus den für Vi und Va gefundenen Werten liessen sich leicht (vgl. die Formeln 22) die zur Erdoberfläche parallelen Strömungen berechnen, welche die darin ausgedrückten Kräfte hervorrufen würden. Ich verzichte indessen darauf, die Koeffizienten der entsprechenden Entwickelungen mitzuteilen, da sie als verhältnismässig unsicher anzusehen sind. Bei V_i ist die Möglichkeit, dass wenigstens ein merklicher Teil auf eine direkte Magnetisierung der Erdrinde zurückgeführt werden muss, nicht abzuweisen; bei V_a andererseits ist die wenn auch nicht absolut, so doch relativ grössere Unsicherheit der gefundenen Werte zu beträchtlich, als dass die Ableitung detaillierter Folgerungen einen hinreichenden Wert besitzen könnte. Ich beschränke mich deshalb auf eine summarische Angabe, die nur die Grössenordnung der zur Erklärung der Erscheinungen nötigen Ströme charakterisieren soll. Dabei denke ich mir in der früher bezeichneten Weise (S. 14) die ganze Strömung durch vertikale Verschiebung in zwei unendlich dünne, der Erdoberfläche beiderseits unendlich benachbarte Schichten zusammengedrängt und gebe die Strömung an, die einen zu ihrer Richtung senkrechten Querschnitt von 1 cm Breite durchsetzt. Die in dieser Weise ausgedrückte mittlere Intensität ist, wenn die bei V, verhältnismässig geringe, bei V_a wenig sichere meridionale Komponente ausser acht bleibt, ziemlich genau 1/2 Amp: cm bei der inneren und ungefähr ¹/₇₀₀ Amp: cm bei der äusseren Strömung. Die Richtung der einen wie der anderen geht von Osten nach Westen.

Es ist hier der Ort, einige weitere Resultate von ähnlicher allgemeiner Bedeutung anzuführen, das Moment und die Axenrichtung des Erdmagneten, die für dessen Wirkung in die Ferne massgebend sind. Diese beiden Begriffe müssen auf den im Innern der Erde entspringenden Teil der Kraft beschränkt werden. Die in V_a zum Ausdruck kommenden äusseren Agentien könnte man sich nur unter ganz speziellen Annahmen über ihre Verteilung durch ein Moment von bestimmter Richtung und Grösse veranschaulichen, wenn man

00076823

diesen Begriff im gewöhnlichen Sinne fasst. Dagegen könnte man allerdings in einem anderen Sinne einen dem Moment entsprechenden Vektor bei V_a angeben, der für die Richtung und Stärke der magnetischen Kraft im Erdmittelpunkte bestimmend wäre. Indessen wäre diese Angabe wohl ohne besonderes Interesse; ich teile deshalb die betreffenden Resultate nicht mit.

Unter der angegebenen Beschränkung ergiebt sich für das magnetische Moment (man könnte es dasjenige des festen Erdkörpers nennen) der Wert

$$M = 8,3481 \cdot 10^{25} cm^{\frac{5}{2}} g^{\frac{1}{2}} s^{-1}$$
 (log $M = 25,92159$)

und als Axenrichtung diejenige nach dem Punkte

$$v = 168^{\circ} 32', 1$$
 $\lambda = 111^{\circ} 29', 4$ oder $u = 168^{\circ} 34', 3$ $\lambda = 111^{\circ} 29', 4.$

Die Axe verbindet also den Punkt von 78° 34′, 3 nördl. geogr. Breite und 68° 30′, 6 westl. Länge v. Grw. mit demjenigen, der unter 78° 34′, 3 südl. geogr. Breite und 111° 29′, 4 östl. Länge liegt.

Zum Vergleiche führe ich an, dass nach der Berechnung von Neumayer und Petersen das Moment $0.32237~R^3$, d. i. (mit $R=6.370\cdot 10^8~cm$) $8.3324\cdot 10^{25}~cm^{\frac{5}{2}}~g^{\frac{1}{2}}~s^{-1}$ beträgt, und dass die Achse nach dem Punkte $\varphi=-78^0~20'$, $\lambda=112^0~43'$ gerichtet ist. Die geringe Abweichung dieser Zahlen von den zuvor angegebenen zeigt in eindrucksvoller Weise, wie sehr unter den Ursachen der erdmagnetischen Kraft die im Erdinnern gelegenen überwiegen.

Es bleibt nun noch die Frage zu untersuchen, welche Sicherheit allen diesen Resultaten zukommt, und welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um ihre Sicherheit zu erhöhen.

Wenn die gegebenen, als beobachtet anzusehenden Werte vollkommen fehlerfrei wären, d. h. wenn sie in voller Schärfe dem thatsächlichen Zustande des Erdmagnetismus in einem bestimmten Augenblicke (sei es auch unter Elimination exakt definierter lokaler und zeitlicher Störungen) entsprächen, so würden die (auszugsweise in den Tabellen XIV mitgeteilten) Differenzen der berechneten und der beobachteten Werte eine Folge des zu frühen Abbrechens der Reihen sein, und sie würden durch Fortsetzung der Entwickelung beliebig verkleinert werden können. Indessen würde es auch in diesem günstigsten Falle unzweckmässig sein, die Entwickelung so weit zu treiben, dass die Differenzen verschwinden; es wäre dies nur dann von Vorteil, wenn man a priori wüsste, dass in der exakten (nur durch Integration über die ganze Erdoberfläche zu erhaltenden) Darstellung alle Glieder höherer Ordnung, die

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

man bei einer Berechnung aus Einzelwerten nicht bestimmen kann, thatsächlich verschwindend klein sind. Weiss man dies nicht — und im vorliegenden Falle ist aus dem blossen Anblicke der ganz unregelmässig und langsam abnehmenden Koeffizienten sogar zu schliessen, dass das Gegenteil der Fall ist, — so würde man, wie schon früher bemerkt wurde, zwar die Darstellung der gerade gegebenen Werte verbessern, diejenige des Gesamtzustandes aber verschlechtern. In noch höherem Grade ist dies der Fall, wenn die gegebenen Zahlen selbst als fehlerhaft gelten müssen, so dass die Aufgabe den Charakter einer Ausgleichungsrechnung annimmt.

So lange daher die Beobachtungsgrundlagen nicht erweitert werden können, wird sich ein gewissermassen tastendes Verfahren empfehlen, das durch successive Erweiterung der Reihenentwickelungen ein Urteil darüber gewinnen lässt, welche Veränderungen die ersten, wichtigsten Koeffizienten dabei erfahren, und wie weit ihre schliesslich angenommenen Werte etwa noch von der Grenze entfernt sein mögen, gegen die sie bei weiterer Entwickelung konvergieren. Ich habe nun, wie an früherer Stelle bemerkt wurde, eine provisorische, nur bis zur 4. Ordnung gehende Darstellung vorgenommen; ausserdem habe ich eine noch stärker abgekürzte, nämlich nur bis zur 2. (bei α X sin v natürlich bis zur 3.) Ordnung ausgedehnte Entwickelung durchgeführt. (Da die Glieder gerader und ungerader Ordnung unabhängig von einander berechnet werden, so sind damit zugleich die beiden dazwischen liegenden Fälle erledigt, bei denen die Entwickelung bis zur 3. und bis zur 5. Ordnung geht.) Ich will die Ergebnisse, von einigen Beispielen abgesehen, nicht mitteilen, sondern nur als zusammenfassendes Resultat angeben, dass diejenigen Teile der Entwickelungen, die von höheren Vielfachen als dem Doppelten der geographischen Länge à abhängen, durchgehends nur als rohe, erste Näherungen gelten dürfen, dass andererseits für m = 0 und m = 1, in geringerem Grade auch für m = 2die ersten Koeffizienten so genau bestimmt sind, dass eine Weiterführung nicht mehr viel an ihnen ändern würde. Eine aufmerksame Betrachtung der in den Tabellen XII angegebenen Differenzen führt zu demselben Schlusse. Von Wichtigkeit für die Beurteilung der Ergebnisse ist noch ein weiterer Umstand. Die beiden für $\alpha X \sin v$ und $\beta Y \sin v$ geltenden Entwickelungen sind früheren Erörterungen (S. 11) zufolge durch eine Anzahl von rein analytischen, nicht etwa aus physikalischen Gründen fliessenden Bedingungsgleichungen verknüpft. Es zeigt sich nun, dass diese Gleichungen im allgemeinen einen überraschend starken Zwang einführen. Ich habe die Koeffizienten beider Entwickelungen stets zuerst selbstständig bestimmt und die Aenderungen, die durch die Einführung der Bedingungsgleichungen verursacht werden, nachträglich berechnet

und hinzugefügt. Diese Aenderungen ergaben sich, wie schon angedeutet wurde, fast in allen Fällen als sehr beträchtlich; sie nehmen mit der fortschreitenden Ausdehnung der Reihenentwickelung ab und sind am kleinsten bei den ersten Gliedern der Reihen. Der Hauptgrund für den in diesen Differenzen zu Tage tretenden Widerspruch liegt in der unregelmässigen Verteilung der erdmagnetischen Kraft, die sich nur durch sehr langsam konvergierende Reihen zur Darstellung bringen lässt; recht störend wirkt auch gerade hier das Fehlen beobachteter Werte aus den Polarregionen, was leicht verständlich ist, wenn man sich erinnert, dass sich jene Bedingungsgleichungen auf die Anordnung der Kräfte an den Polen beziehen. Die den gegebenen Werten anhaftenden Fehler sind nur mittelbar von Einfluss, insofern sie nämlich bei ihrer ganz regellosen Verteilung besonders zu den Gliedern von hoher Ordnungszahl relativ beträchtliche Beiträge liefern.

Als Beispiel führe ich den mit $\cos \lambda$ multiplizierten Teil der Reihe für $\alpha X \sin v$ und den damit zusammenhängenden Faktor von $\sin \lambda$ in der Reihe für $\beta Y \sin v$ an.

Wird die Entwickelung bis zu R_1^3 bei X, also bis R_1^2 bei Y ausgedehnt, so sind die ohne Rücksicht auf die Bedingungsgleichungen bestimmten Koeffizienten

$$-1943,9$$
 $198,9$ $732,9$ $-1341,3$ $1273,8,$

während die thatsächlich zu wählenden, den Bedingungsgleichungen genügenden folgendermassen lauten:

$$-1872,1 -455,5 1128,5$$

- 1018,6 1051,2.

Geht die Entwickelung zwei Stufen weiter, so ergeben sich als selbständig berechnet die Zahlen:

$$-1930,5$$
 $205,7$ $757,6$ $-997,5$ $178,9$ $-1290,8$ $1272,5$ $-525,9$ $189,7$

und als ausgeglichen:

$$-1913,2$$
 270,8 817,1 $-790,2$ 308,7 $-1312,3$ 1249,6 $-644,1$ 116,8.

Werden endlich in jeder Reihe noch zwei weitere Glieder berücksichtigt, so sind die entsprechenden Koeffizienten

$$-1932,3$$
 270,4 752,1 $-899,9$ 172,0 313,4 $-13,9$ $-1279,8$ 1272,1 $-505,5$ 189,1 147,9 $-1,7$

und

$$-1920,9$$
 $258,4$ $788,5$ $-924,4$ $226,9$ $273,9$ $54,6$ $-1276,9$ $1260,9$ $-495,5$ $166,1$ $169,7$ $-38,7$.

Die Betrachtung dieser Zahlen lässt deutlich erkennen, dass nur die ersten Koeffizienten einigermassen sicher gestellt sind, und dass eine getrennte Berechnung der einzelnen durchaus zu erstreben ist. Eine solche erfordert aber (auch wenn sie nicht durch Auswertung von Oberflächen-Integralen, sondern nach der Neumann'schen Methode vorgenommen wird) die Kenntnis der magnetischen Elemente in den Polargebieten.

Berechnet man aus den vorstehend mitgetheilten Partialentwicklungen von X und Y die entsprechenden Teile der Reihen für (V:b) und $\alpha \beta b i$, so müssen sich natürlich ähnliche Verschiedenheiten bei fortschreitender Erweiterung der Reihen ergeben. Die Koeffizienten von $R_1^1 \cos \lambda$, $R_1^2 \cos \lambda$ in (V:b) sind in den drei betrachteten Fällen

und diejenigen von $R_1^1 \sin \lambda$, $R_1^2 \sin \lambda$... in $\alpha \beta b i$

$$-45.8$$
 -30.4 -52.1 -26.0
 -33.3 3.3 -39.7 47.9 -54.5 .

Die durch keine Bedingungsgleichung (ausser der einen $j_0^0=0$) beschränkten Koeffizienten der Reihe für γZ zeigen bei fortgesetzter Entwickelung im allgemeinen geringere Aenderungen. Auch hier sollen die zu $R_1^1 \cos \lambda$, $R_1^2 \cos \lambda$... gehörigen Koeffizienten als illustrierendes Beispiel angeführt werden. Sie lauten in den drei Fällen folgendermassen:

$$3083 - 3819$$
 $2893 - 3813 1984 - 868$
 $2847 - 3841 1900 - 909 - 607 - 132.$

Was die soeben erwähnte Bedingungsgleichung $j_0^0 = 0$ betrifft, so zeigt sich diese im Gegensatze zu den anderen, vorher erwähnten fast ohne jeden Zwang erfüllt. Bestimmt man die Koeffizienten j_0^0 , j_0^2 , j_0^4 , j_0^6 ohne Rücksicht auf jene Gleichung, so findet man 5,9 708,5 — 1265,2 — 34,7, während unter Berücksichtigung der Bedingung 0 701,4 — 1272,6 — 40,0 folgt.

Die vorhergehenden Betrachtungen sind durchaus geeignet, den Eindruck zu erwecken, dass die verhältnismässig kleinen Differenzen, aus denen die Existenz einer die Erdoberfläche durchdringenden Strömung und eines Potentials äusserer Agentien erschlossen worden sind, als illusorisch bezeichnet werden müssen. Und dieser Eindruck wird durch weitere Betrachtungen noch verstärkt. Die Tabelle VII enthält bei X und Y je vier Kolumnen, von denen bisher nur die letzte erwähnt worden ist. Die in den drei vorhergehenden Spalten stehenden Zahlen bezeichnen nun die Koeffizienten der Reihen unter den folgenden Voraussetzungen:

I. Es ist i=0, $V_a=0$, d. h. die erdmagnetische Kraft beruht, wie es die Gaussische Theorie annahm, ausschliesslich auf der Wirkung von inneren Ursachen. Unter dieser Voraussetzung sind die Reihen für $\alpha X \sin v$ und $\beta Y \sin v$ aus derjenigen für γZ berechnet worden.

II. Die Reihen sind ohne Rücksicht auf die Bedingungsgleichungen entwickelt worden. (Einige der hier angeführten Zahlen haben bereits (S. 36) Erwähnung gefunden.)

III. Es ist i = 0, d. h. die Reihen sind unter der Annahme berechnet worden, dass die ganze Kraft ein Potential besitzt, welches indessen z. T. auf äusseren Ursachen beruhen kann.

Man sieht, dass das Ergebnis der ohne jede Hypothese durchgeführten Rechnung, das in Spalte IV verzeichnet ist, sich nicht viel besser an II anschliesst, als dies III thut, während I allerdings fast durchgängig etwas weiter abweicht. Dabei ist indessen zu bedenken, dass I sich auf die unverändert angenommenen Werte von γZ stützt; bei einer gemeinsamen Ausgleichung von X, Y, Z (wie sie die Gaussische Bearbeitung vornimmt) würde statt I ein zwischen I und III gelegenes Wertesystem erzielt worden sein.

Um die Sache noch von einer anderen Seite zu beleuchten, habe ich, allerdings nur für den von $\cos \lambda$ und $\sin \lambda$ abhängigen Teil, aus allen vier Koeffizientensystemen die Werte von k_1 K_1 l_1 l_1 berechnet und habe ihre Differenzen gegen die beobachteten gebildet. Sie stehen in den Tabellen XIIIa und b. Bei der Vergleichung darf man nicht vergessen, dass die Fehlerquadratsumme nicht aus ihnen selbst, sondern aus ihrem Produkt mit $\sin u$ (oder streng mit $\alpha \sin v$ bei X, $\beta \sin v$ bei Y) zu bilden ist, so dass starke Differenzen in höheren Breiten weniger ins Gewicht fallen, als solche in der Nähe des Aequators. Man sieht nun in der That, dass die Differenzen bei IV denen bei II, die natürlich das Fehlerminimum darstellen, merklich näher kommen, als die beiden anderen. Es spricht dies dafür, dass trotz aller Unsicherheit der einzelnen Koeffizienten doch die durch ihre Gesamtheit gegebene Darstellung der thatsächlichen Kraftverteilung einen deutlichen Fortschritt aufweist, wenn man auf die Hypothesen, dass i und V_a verschwinden, verzichtet.

Ich habe bisher diejenige Unsicherheit, die aus der Fehlerhaftigkeit der beobachteten Werte entspringt, noch nicht berücksichtigt. Die vorausgehenden Betrachtungen werden dadurch kaum berührt, da beispielsweise der Einfluss auf die vier parallel laufenden Rechnungen nicht sehr verschieden sein kann. In welcher Stärke und in welchem Sinne sich dieser Einfluss in den Endergebnissen geltend macht, ist nun noch zu untersuchen. Eine scharfe Berechnung ist freilich gegenwärtig unmöglich und wird noch lange Zeit unausführbar sein; denn sie setzt die Kenntnis der den einzelnen verwertbaren Beobachtungen und Landesaufnahmen, sowie der den angenommenen Säkular-Variationen anhaftenden, ausserordentlich wechselnden Unsicherheit voraus, und wenn es noch immer für weite Gebiete schwierig ist, überhaupt brauchbare Werte der magnetischen Elemente zu gewinnen, so ist es natürlich noch viel schwieriger, sich ausserdem ein Urteil über ihre ungefähre Schärfe zu bilden. Selbst nur eine rohe Schätzung ist hier auf direktem Wege nicht möglich, da sie durchaus auf das in den Karten verarbeitete Originalmaterial zurückgehen müsste. Aus der Betrachtung der Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten lässt sich indessen indirekt ein Schluss auf den möglichen Betrag des mittleren Fehlers der ersten ziehen. Die langsame Abnahme der Koeffizienten der Reihenentwickelung mit wachsender Ordnungszahl n macht es unzweifelhaft, dass die noch verbleibenden Differenzen zum grossen Teile auf Rechnung der unzureichenden Ausdehnung der Reihen zu setzen sind, und die von regelloser Anordnung noch weit entfernte Gruppierung dieser Differenzen führt zu demselben Schlusse. Beachtet man nun, wie wesentlich nach früheren Angaben (S. 28) die mittlere Abweichung durch die Hinzunahme der Glieder 5. und 6. Ordnung vermindert worden ist, so wird man unbedenklich annehmen können, dass der auf die Ungenauigkeit der beobachteten Werte zurückzuführende mittlere Betrag der Abweichungen höchstens halb so gross ist, wie der Gesamtbetrag derselben. Ich will demgemäss in runder Zahl annehmen, dass an jedem der benutzten 1800 Punkte die Werte der Kraftkomponenten mit einem mittleren Fehler von ± 200 bei X und Y, von ± 400 bei Z behaftet sind, welche Zahlen danach wohl als obere Grenzen angesehen werden dürfen. Als ungefähr gleichwertig hiermit können bei der Deklination und Horizontalintensität mittlere Fehler von ± 20' und ± 0,002 cm⁻¹ g¹ s⁻¹, bei der Inklination solche von der Grössenordnung von 1º gelten. Natürlich sind alle unbekannten Einflüsse zeitlicher oder örtlicher Störungen, die Ungenauigkeit der Beobachtung selbst und die Unsicherheit der Reduktion auf die Normalepoche, endlich auch diejenige bei der Zeichnung der isomagnetischen Linien und bei der interpolatorischen Entnahme

der Werte für bestimmte Punkte aus den Karten in jenen Zahlen enthalten.

Da bei diesem Verfahren die ausserordentliche Verschiedenheit, welche zwischen den einzelnen Gegenden der Erdoberfläche in Bezug auf die Zuverlässigkeit unserer Kenntnis ihres magnetischen Zustandes besteht, vollkommen ausser acht gelassen wird, so kann es nur als eine summarische Schätzung bezeichnet werden; eine wesentliche Verfälschung der hier daraus abzuleitenden Folgerungen ist aber sicherlich nicht zu befürchten, da es sich nur darum handelt, die mittlere zu erwartende Unsicherheit ihrer Grössenordnung nach zu bestimmen.

Die Koeffizienten k_m , K_m der trigonometrischen Reihen sind aus je 36 Einzelwerten abgeleitet; ihr mittlerer Fehler ergiebt sich also aus den oben angesetzten Beträgen durch Hinzufügung des Faktors $^1/_6$ oder $^1/_6\sqrt{2}$, je nachdem der Index m gleich 0 ist oder nicht. Bezeichne ich den absoluten Betrag des Fehlers mit ε , so ist also

für
$$m=0$$
 bei X und $Y:\varepsilon=33$ bei $Z:\varepsilon=67$ für $m=1,\ 2,\ 3,\ 4$ bei X und $Y:\varepsilon=47$ bei $Z:\varepsilon=93$

zu setzen. (Eine weitere Abrundung dieser Zahlen, die an sich gerechtfertigt wäre, unterlasse ich, um die Verhältnisse der verschiedenen Werte nicht zu sehr zu verwischen.)

Die Normalgleichungen, durch welche die Koeffizienten B, C, D, E, j, k aus den Werten von k_m , K_m ... bestimmt werden, führen auch in bekannter Weise zur Berechnung der mittleren Fehler der ersteren. Ich gebe wiederum nur einige, zur Charakterisierung ausreichende Resultate an. Dabei muss ich bemerken, dass ich zur wesentlichen Abkürzung der Rechnung bei X und Y die für ε angegebenen Werte als mittlere Fehler der Grössen $\alpha k \sin v$, $\alpha K \sin v$. angenommen habe, während sie zu k, K. gehören. Die Fehler von B, C, D, E, die sich so ergeben und von denen einige nun angeführt werden sollen, sind daher etwas zu gross, was kein Uebelstand ist, da es sich um die Berechnung einer oberen Grenze für sie handelt.

Für m=0 ergeben sich die folgenden zu befürchtenden mittleren Fehler der Koeffizienten B_0^n , D_0^n , j_0^n :

$$n=$$
 0 1 2 3 4 5 6 7
bei X \pm (90) (44) 15 13 19 13 17 14
bei Y \pm (90) (24) 15 11 19 9 17
bei Z \pm 52 51 60 45 55 36.

Die auf B_0^0 , B_0^1 , D_0^0 , D_0^1 bezüglichen Werte sind in Klammern eingeschlossen, weil diese Koeffizienten vollkommen durch die andern bestimmt sind (S. 25) und daher auf die Werte der dargestellten Funktion ohne selbständigen Einfluss sind.

00076823

Zur Kennzeichnung des Einflusses, den die grössere oder geringere Ausdehnung der Reihenentwickelung auf die mittleren Fehler der Koeffizienten hat, soweit diese von der Fehlerhaftigkeit des Beobachtungsmaterials herrühren, mag die Anführung eines typischen Beispiels genügen. Je nachdem man in der Berechnung der Koeffizienten j_0^2 , j_0^4 , j_0^6 mit dem ersten, dem zweiten oder, wie es in der vorliegenden Arbeit geschehen ist, mit dem dritten abbricht, sind die mittleren Fehler

$$0,24 \ \epsilon;$$
 $0,37 \ \epsilon,$ $0,37 \ \epsilon;$ $0,77 \ \epsilon,$ $0,67 \ \epsilon,$ $0,54 \ \epsilon.$

Diese Zahlen lassen deutlich erkennen, dass eine unkritische Weiterführung der Entwickelung ohne Ausdehnung der empirischen Grundlage schliesslich nicht mehr zur Verbesserung, sondern zur Verschlechterung der Resultate führen muss.

Für m=1, welchen Fall ich nur noch anführen will, da die Resultate für $m=2,\ 3,\ 4$ von derselben Grössenordnung sind, finden sich folgende Fehlerbeträge:

Diese Fehlerbeträge hängen natürlich von der Gestaltung der Normalgleichungen ab; sie würden noch verringert werden, wenn die Beobachtungen ganz gleichmässig über die Erdoberfläche verteilt wären.

Die in Vorstehendem angegebenen mittleren Fehler, die überdies obere Grenzwerte darstellen, sind geringfügig und kommen insbesondere bei den ersten Koeffizienten der Reihen kaum in Betracht. Es ist dieser Umstand eine Folge davon, dass die Entwickelung auf den Elementen einer ausserordentlich grossen Anzahl von Punkten beruht. Die analytische Darstellung der Kraftkomponenten selbst kann also, abgesehen von dem systematischen Fehler des Abbrechens der Reihen, als eine sehr scharfe und zuverlässige bezeichnet werden.

Viel weniger günstig verhält es sich mit den Reihen für V_i , V_a und i. Die zu befürchtenden mittleren Fehler werden hier nicht nur relativ grösser,

THEMSONS

dollessidos

oladinaoff no

sondern sie erreichen ihre stärksten Werte gerade bei den ersten und wichtigsten Koeffizienten. Ich will mich auch hier auf die Anführung eines Beispiels beschränken, und zwar wähle ich dazu diejenigen Koeffizienten der soeben genannten Funktionen, die sich aus den zuvor bei X, Y, Z beispielsweise angeführten Koeffizienten ergeben. Es sind dies die mit $R_0^1, R_0^2 \dots$ und die mit $R_1^1, R_1^2 \dots$ verbundenen Faktoren. Ich stelle sie in ähnlicher Anordnung wie bei den vorhergehenden Beispielen zusammen:

m = 0	n =	1	2	3	4	5	6
m. F. bei V_i : b	+	31	15	12	7	6	3
m. F. bei $V_a:b$	+	41	16	14	7	7	3
m. F. bei $\alpha \beta b i$	士	14	7	18	7	16	
m = 1	n =	1	2	3	4	5	6
m=1 m. F. bei V_i : b			2 27				6 16
	土	53		33	19	23	16

Diesel Zahles

der Entwick

Wenigstens bei m=1 (und ähnlich ist es bei m=2,3,4) überschreiten diese Fehlerbeträge, die allerdings obere Grenzwerte sind, vielfach die Werte der Koeffizienten von V_a und i. Gerade diese in physikalischer Hinsicht interessanten Funktionen werden daher so unsicher, dass es zweifelhaft erscheint, ob sie nicht überhaupt nur ein Produkt der Beobachtungsfehler sind. Dafür, dass dies nicht der Fall ist, sprechen allerdings einige frühere Erfahrungen (S. 29, 38) und es können in der That auch die einzelnen Entwickelungskoeffizienten sehr unsicher sein, während doch die dargestellte Funktion selbst an manchen Stellen Werte von viel geringerer Unsicherheit annimmt. Es liegt dies daran, dass die Koeffizienten von einander abhängig sind, da sie teilweise von denselben Variabeln (Koeffizienten der Reihen für X, Y, Z) abhängen.

Für die Realität von V_a und i spricht alsdann der Umstand, dass wenigstens ein Teil dieser Funktionen, nämlich derjenige, der zum Index m=0 gehört und der somit von der geographischen Länge unabhängig ist, merklich über die Fehlergrenzen hinausreicht, so dass er nicht wohl als Ergebnis blosser innerer Widersprüche der gegebenen Daten angesehen werden kann. Die genauere Betrachtung verstärkt diesen Eindruck. Der von λ freie Bestandteil in α β b i folgt aus dem gleichfalls nur von v abhängigen Teile der Entwickelung von β Y sin v, dessen Koeffizienten auf den einzelnen Parallelkreisen durch l_0 bezeichnet worden sind. Der Umstand, dass bei der Entwickelung nach λ volle Kreise mit gleichförmig verteilten Beobachtungswerten vorliegen,

(im Gegensatze zu den Entwickelungen nach v, die hier immer nur auf den Bogen von $v=30^{\circ}$ bis $v=150^{\circ}$ gestützt werden können) bewirkt, dass die Koeffizienten der trigonometrischen Reihen fast allein infolge der Fehler der empirischen Daten von ihren wahren Werten abweichen können. Der Einfluss dieser zufälligen Fehler auf l_0 wurde kurz zuvor (S. 40) schätzungsweise zu ± 33 gefunden. Vergleicht man nun damit die in Tabelle VI b gegebenen Werte von l_0 , die selbst in den verhältnismässig gut erforschten mittleren Breiten der Nordhalbkugel bis zu 150, auf der Südhalbkugel sogar bis zum doppelten Betrage anwachsen, sieht man ferner, dass diese Zahlen einen sehr deutlich ausgeprägten Gang aufweisen, so scheint es durchaus unmöglich zu sein, dieselben auf Fehler des Beobachtungsmaterials zurückzuführen. Es wäre dies höchstens dann denkbar, wenn starke systematische Fehler über grosse Gebiete (ganze Kontinente oder Ozeane) verbreitet sein könnten, eine Annahme, die durchaus unwahrscheinlich ist.

Wenn nun aber einmal durch die beträchtlichen Werte von l_0 die Existenz vertikaler Strömungen i mit grösster Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, so liegt kein Grund vor, anzunehmen, dass die in der Entwickelung von i gefundenen Koeffizienten mit den Indices $m=1,\ 2,\ 3,\ 4$ thatsächlich Null sind, und dass die dafür gefundenen Werte nur von Beobachtungsfehlern herrühren. Aber freilich sind diese Koeffizienten dem zuvor Gesagten zufolge so unsicher ermittelt, dass eine Auswertung der für i gefundenen Reihe nur Werte von recht zweifelhafter Bedeutung liefern könnte. Deswegen verzichte ich darauf, über die von mir in dieser Richtung ausgeführten Rechnungen etwas mitzuteilen.

Giebt es Ströme, die den Raum innerhalb der Erdoberfläche mit demjenigen ausserhalb verbinden, so ist damit auch ein Potential äusserer Kräfte in der Erdoberfläche als notwendig nachgewiesen. Doch auch unabhängig hiervon spricht für die reale Existenz von V_a mindestens wieder der starke, nicht auf Beobachtungsmängel zurückzuführende Wert des Koeffizienten von R_0^1 , wohl auch noch desjenigen von R_1^1 .

states de la martine de la companie de la companie

Ueberblicken wir nun die wesentlichen Resultate noch einmal im Zusammenhange. Es kann zunächst behauptet werden, dass die erste Aufgabe, die der rein analytischen Darstellung der beobachteten Erscheinungen, bei der hier angewandten Ausdehnung der Reihen in nahezu hinreichender Weise gelöst ist. Die noch übrig bleibenden Differenzen zeigen, dass die Hinzunahme der Glieder, die vom 5 fachen, höchstens noch derjenigen, die vom 6 fachen der geographischen Länge λ abhängen und derjenigen 7. und 8. Ordnung in den

Kugelfunktionen der Poldistanz v sicherlich ausreichen würde, um die Darstellung der beobachteten Werte so genau zu machen, wie es im Hinblick auf den Grad ihrer eigenen Sicherheit überhaupt erstrebenswert ist. Andrerseits steht fest, dass bei einer solchen Erweiterung der Reihen die äusserste Grenze erreicht, vielleicht schon etwas überschritten ist, jenseits deren die wachsenden zufälligen Fehler der berechneten Koeffizienten den Gewinn schärferer Darstellung wieder aufheben und in sein Gegenteil verkehren. Dieser Uebelstand würde sich allerdings wohl noch etwas vermindern lassen, wenn man die freilich an sich schon sehr grosse Zahl von 1800 Punkten, von denen die Elemente benützt werden, noch vermehrte oder wenn man sich bei der Entwickelung überhaupt auf die graphische Darstellung der Elemente stützte; eine beträchtliche Verringerung der resultierenden mittleren Fehler ist indessen dabei nicht zu erwarten, weil der grösste Teil der Erdoberfläche nicht eingehend genug vermessen ist, damit die Fehler in benachbarten Punkten als gegenseitig unabhängig gelten und wie zufällige Fehler behandelt werden dürfen. pertikator Stromungen e mit grosster Wahrschendidtseit

Kann demnach die Gesamtdarstellung im wesentlichen als befriedigend bezeichnet werden, so sind doch von den Koeffizienten der Reihen nur die allerersten als zuverlässig bestimmt anzusehen. Infolge dessen sind die daraus abgeleiteten Reihen für Vi, Va und i, in denen gerade die physikalisch interessantesten Ergebnisse zum Ausdrucke kommen, schon absolut betrachtet weniger sicher, denn jeder ihrer Koeffizienten beruht auf mehreren Koeffizienten der ursprünglichen Reihen. Da sich nun obendrein V_a und i als recht geringfügig ergeben, so sind bei ihnen die möglichen Fehler relativ betrachtet ausserordentlich gross, so gross, dass die thatsächliche Existenz der darin ausgesprochenen physikalischen Bedingungen beinahe in Frage gestellt wird. Und wenn trotzdem sowohl ein Potential äusserer Agentien als auch ein nicht auf ein Potential zurückführbarer Bestandteil der horizontalen Kraft als erwiesen gelten darf, so muss doch zugestanden werden, dass über die genaue Gestaltung beider auf der vorliegenden Grundlage nichts Zuverlässiges ermittelt werden kann. Gerade die Kenntnis dieser Gestaltung im Einzelnen, d. h. der Verteilung der Funktionswerte von Va und i über die Erdoberfläche ist aber durchaus erforderlich, wenn man daran gehen will, die nunmehr auftretende Frage nach der Natur dieser Erscheinungen zu behandeln. Wie wichtig würde es beispielsweise sein, um nur auf eine Möglichkeit hinzuweisen, wenn sich in der Anordnung der positiven und negativen Werte von i eine Analogie mit der Konfiguration von Wasser und Land oder ein Zusammenhang mit klimatischen Gebieten zeigte. Es wird nach dem soeben Gesagten keiner Rechtfertigung bedürfen, dass ich auf Spekulationen über derartige mögliche Beziehungen, wie überhaupt auf jede physikalische Deutung der Erscheinungen verzichte, obgleich manche Veranlassung dazu gefunden werden könnte. Ich will nur auf die Folgerungen hinweisen, die sich einerseits aus der langsamen Konvergenz der Reihen, andrerseits aus dem Umstande ergeben, dass die ersten Glieder, aus denen das magnetische Moment entspringt, alle übrigen recht beträchtlich überragen, und ich will ferner die gegenseitige Einwirkung der innern und äusseren Agentien auf einander wenigstens erwähnen. Irgendwie näher auf alles dies und manches andere einzugehen, verbietet nicht nur die Rücksicht auf die oben geschilderten Umstände; es läge auch ausserhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit, die nur eine möglichst exakte analytische Darstellung des beobachteten Thatbestandes erstrebt.

Durch die Benutzung des aus den Gegenden nördlich vom 60. Grade n. Br. vorliegenden Materials und durch eine in bereits angedeuteter Weise (S. 21) modifizierte Koeffizientenbestimmung würden sich die Ergebnisse wohl etwas günstiger gestalten lassen. Ein wesentlicher Fortschritt aber in Bezug auf die Sicherheit der Resultate kann, wie aus den vorstehenden Betrachtungen hervorgeht, nur dann erzielt werden, wenn der Berechnung eine möglichst lückenlose, gleichmässige Kenntnis von der Verteilung der erdmagnetischen Kräfte in der Erdoberfläche zugrunde gelegt werden kann. Dies erfordert natürlich vor allem die Gewinnung neuen zuverlässigen Materials aus der Südpolarregion, dann aber auch die Anstellung neuer Beobachtungen in zahlreichen, weitgedehnten, zugänglicheren Gebieten mit besonderer Berücksichtigung der Bestimmung der Säkular-Variation. Eine sehr grosse Schärfe im Einzelnen und eine sehr detaillierte Kenntnis der Kraftverteilung in kleineren Gebieten, so wichtig sie auch für andere, spezielle Aufgaben sind, dürfen für den vorliegenden Zweck insofern weniger bedeutungsvoll genannt werden, als sie den Mangel von Beobachtungen an andern Stellen nicht aufzuwiegen vermögen.

Für die künftige Forschung ergiebt sich aus den vorhergehenden Ergebnissen und Erwägungen die Forderung, dass in höherem Masse, als es bisher meistens geschehen ist, die Betrachtung der erdmagnetischen Erscheinungen als eines einheitlichen Phänomens in den Vordergrund zu treten hat. Die zahlreichen Einzeluntersuchungen von speziellen Aufgaben, die sich der Forschung von den mannigfaltigsten Gesichtspunkten aus darbieten, dürfen darum natürlich nicht unterschätzt oder gar vernachlässigt werden; aber so wichtig sie auch sind, so erhalten sie ihren wahren Wert doch erst durch die Einordnung in den Zusammenhang der Erscheinungen, und dessen Erforschung

darf noch viel weniger um jener willen zurücktreten. Als die dringendste Aufgabe der nächsten Zeit muss es daher bezeichnet werden, ein wenn auch zunächst nur in grossen Zügen gehaltenes, erst allmählich weiter auszuführendes, einheitliches Bild von dem Gesamtzustande des erdmagnetischen Systems in seinen verschiedenen Beziehungen auf dem Wege der Beobachtung zu gewinnen und seine stetige Aenderung zu verfolgen. Dazu bedarf es eines planmässigen, organisierten Vorgehens; es bedarf dessen um so mehr, je geringer die äusseren Mittel sind, die der Forschung zur Lösung ihrer Aufgaben zu Gebote stehen.

Ia. Tabelle der Koeffizienten $(\pi_m^n : p_m^n)$.

dillered Selbingons tening upp. oils thindal and action of the thought being the

m	0	1	2	3 411	4	5	6
0 1 2 3 4 5 6	1,000000	1,000000	0,997765 0,996663 0,993326	0,997323 0,996881 0,995551 0,993326	0,997133 0,996896 0,996183 0,994994 0,993326	0,997027 0,996879 0,996436 0,995697 0,994660 0,993326	0,996960 0,996859 0,996557 0,996053 0,995347 0,994438 0,993326

Ib. Tabelle der Koeffizienten $(\varkappa_m^n:q_m^n)$.

n	0	I	2	3	4	5	6
m							
0	0,995547	0,995991	0,996181	0,996286	0,996355	0,996400	0,996436
I		0,995325	0,995864	0,996103	0,996234	0,996316	0,996372
2			0,994913	0,995546	0,995870	0,996060	0,996181
3	LINY, JUNE	Mary Lives	STATE OF THE PARTY.	0,994622	0,995264	0,995633	0,995864
4					0,994416	0,995035	0,995420
5						0,994266	0,994850
6							0,994151

Ic. Tabelle der Koeffizienten δ_m^n .

12	0	I	2	3	4	5	6
m		THE DESIGNATION					
0	1,004473	0,334227	0,200639	0,143325	0,111479	0,091211	0,077179
/ I		0,335125	0,200766	0,143368	0,111498	0,091222	0,077186
2			0,201151	0,143496	0,111556	0,091254	0,077205
3		A SERVICE		0,143710	0,111653	0,091305	0,077236
4	a fr fatherwall al			and news	0,111789	0,091378	0,077280
5						0,091473	0,077336
6	NEW THE SE						0,077405

Id. Tabelle der Koeffizienten ε_m^n .

00076823

m n	0	I (.as the	2	3	4	5	6
O I 2 3 4 5 6	0,000000	0,334227	0,400381 0,400193 0,399617	0,428825 0,428763 0,428573 0,428252	0,444637 0,444609 0,444522 0,444378 0,444174	0,454701 0,454686 0,454643 0,454561 0,454452 0,454311	0,461669 0,461660 0,461632 0,461586 0,461520 0,461436 0,461332

II. Tabelle der Faktoren α , β , γ , $\alpha \sin v$, $\beta \sin v$.

и	v	α	0 70000	a sin v	$\beta \sin v$
00	00 0' 0"	1,003354	1,000000	0,000000	0,000000
5°	50 1' 0"	1,003328	0,999974	0,087737	0,087739
100	100 1' 58"	1,003252	0,999899	0,174778	0,174796
150	150 2' 53"	1,003128	0,999775	0,260441	0,260500
200	200 3' 42"	1,002960	0,999607	0,344047	0,344182
25°	25° 4' 25"	1,002752	0,999401	0,424949	0,425204
300	30° 4′ 59″	1,002512	0,999161	0,502514	0,502936
35°	35° 5′ 25″	1,002247	0,998897	0,576158	0,576794
400	400 5' 40"	1,001964	0,998615	0,645314	0,646210
45°	45° 5′ 45″	1,001673	0,998324	0,709473	0,710664
50°	50° 5′ 40"	1,001382	0,998034	0,768163	0,769676
55°	55° 5′ 24″	1,001100	0,997753	0,820954	0,822802
600	60° 4′ 59″	1,000835	0,997490	0,867473	0,869656
65°	650 4' 24"	1,000597	0,997252	0,907389	0,909890
700	700 3' 42"	1,000391	0,997047	0,940427	0,943213
75°	75° 2′ 52″	1,000224	0,996880	0,966357	0,969382
800	80° 1′ 58″	1,000101	0,996757	0,985006	0,988210
85°	850 1' 0"	1,000025	0,996682	0,996245	0,999561
900	900 0' 0"	1,000000	0,996657	1,000000	1,003354

 $\beta = 1,003354$

III. Tabelle der Faktoren r_m^n .

m	0	1	2	3	4	5	6	7
0 1 2 3 4 5 6 7	1,000000	1,732051	3,872983	6,614378 8,100926 5,123475 2,091650	16,60196	26,11842 33,71874 25,48897 15,60874 7,358031 2,326814	52,05515 68,15619 53,88220 35,92146 19,67500 8,389446 2,421825	137,3732 112,1647 79,31244 47,82720 23,91360

IV. Tabelle der Funktionen $R_m^n (\cos v)$. $(\operatorname{tg} v = \operatorname{tg} u \sqrt{1 + \varepsilon^2} = 1,003354 \operatorname{tg} u.)$

26	$R_{\rm o}^{\rm I}$	$R_{\mathtt{x}}^{\mathtt{I}}$	$R_{\rm o}^2$	$R_{\mathtt{I}}^{2}$	R_2^2
00	1,732051	0,000000	2,236068	0,000000	0,000000
5°	1,725416	0,151460	2,210420	0,337378	0,014808
100	1,705565	0,301743	2,134272	0,664401	0,058772
150	1,672656	0,449691	2,009977	0.971058	0,130534
200	1,626957	0,594147	1,841390	1,247943	0,227868
25 ⁰	1,568830	0,734013	1,633700	1,486633	0.347777
300	1,498743	0,868199	1,393329	1,679851	0,486556
35°	1,417246	0,995698	1,127634	1,821785	0,639955
400	1,324991	1,115526	0,844788	1,908171	0,803256
45°	1,222695	1,226792	0,553407	1,936481	0,971485
500	1,111152	1,328662	0,262357	1,905954	1,139523
55°	0,991234	1,420372	-0,019517	1,817618	1,302262
60°	0,863850	1,501254	-0,283716	1,674237	1,454798
65°	0,729987	1,570707	-0,522256	1,480248	1,592519
70°	0,590644	1,628232	-0,727996	1,241557	1,711303
75°	0,446893	1,673406	- 0,894749	0,965448	1,807578
800	0,299792	1,705909	- 1,017551	0,660237	1,878478
85°	0,150456	1,725504	- 1,092725	0,335159	1,921880
900	0,000000	1,732051	- 1,118034	0,000000	1,936492
	100017.0	1005,0 4566	279100		
u	R_0^3	R_{τ}^{3}	R_2^3	R_2^3	$R_{\rm o}^4$
0	ARBONA DIST	1708.0 10010			3 Pod
00	2,645751	0,000000	0,000000	0,000000	3,00000
50	2,585232	0,561295	0,039028	0,001399	2,88607
100	2,407619	1,086188	0,153118	0,011059	2,55684
150	2,124456	1,540816	0,333517	0,036606	2,04853
200	1,754126	1,896107	0,566301	0,084429	1,41668
250	1,320482	2,129881	0,833423	0,159191	0,72945
300	0,851320	2,228245	1,113906	0,263430	0,05973
35°	0,376303	2,186571	1,385426	0,397365	- 0,52367
400	- 0,074886	2,009743	1,625756	0,558788	-0,96372
45°	-0,474734	1,711741	1,814440	0,743224	- 1,22185
500	-0,799634	1,314642	1,934127	0,944170	- 1,28191
55°	- 1,031448	0,847103	1,971800	1,153488	- 1,15168
600	— 1,158747	0,342267	1,919682	1,361976	-0,86129
65°	- 1,177442	-0,164361	1,775775	1,559884	-0,45919
700	- 1,091044	-0,637506	1.543979	1,737625	- 0,00574
75°	-0,910349	- 1,044301	1,233924	1,886301	0,43424
80°	-0,652611	- 1,356706	0,860229	1,998364	0,79975
85°	- 0,340403	- 1,553165	0,441697	2,068020	1,04086
900	0,000000	- 1,620185	0,000000	2,091650	1,12500
A CONTRACTOR					
VERMINE					

u	$R_{\mathbf{I}}^{4}$	R_2^4	R_3^4	R_{4}^{4}	$R_{\rm o}^5$
00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,31663
5°	0,81534	0,07626	0,00418	0,00013	3,12860
100	1,54101	0,29457	0,03267	0.00204	2,59577
150	2,09801	0,62493	0,10605	0,01008	1,80621
200	2,42735	1,02149	0,23792	0,03072	0,88896
25°	2,49703	1,42847	0,43257	0,07155	- 0,00945
300	2,30552	1,78712	0,68384	0,14006	- 0,75090.
35°	1,88170	2,04323	0,97543	0,24229	- 1,23007
40°	1,28116	2,15398	1,28239	0,38172	- 1,39198
45°	0,57904	2,09348	1,57398	0,55835	- 1,24033
50°	-0,13904	1,85615	1,81712	0,76821	-0,83460
55°	-0,78738	1,45779	1,98039	1,00330	- 0,27718
600	- 1,29057	0,93386	2,03783	1,25210	0,30724
65°	- 1,59230	0,33567	1,97228	1,50039	0,79568
700	- 1,66200	- 0,27565	1,77764	1,73256	1,09026
75° 80°	- 1,49814	-0,83593	1,46007	1,93298	1,13591
850	- 1,12815	- 1,28565	1,03766	2,08760	0,92994
	- 0,60489	- 1,57648	0,53893	2,18518	0,52130
900	0,00000	— 1,67705	0,00000	2,21853	0,00000
16	$R_{ m r}^5$	R_2^5	R_3^5	R_4^5	R_5^5
00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5°	1,09337	0,12796	0,00920	0,00043	0,00001
100	2,00549	0,48472	0,07085	0,00667	0,00037
150	2,58796	0,99431	0,22440	0,03229	0,00274
200	2,75174	1,54670	0,48590	0,09570	0,01105
250	2,48279	2,01952	0,84261	0,21496	0,03180
300	1,84353	2,30204	1,25347	0,40194	0,07363
35°	0,96018	2,31720	1,65588	0,65753	0,14608
400	-0,00120	2,03711	1,97691	0,96848	0,25784
45°	— 0,86620	1,48936	2,14759	1,30725	0,41478
50°	— 1,48401 — 1,75460	0,75264	2,11685	1,63452	0,61806
55°	— 1,75469 — 1,61619	-0,05708	1,86276	1,90433	0,86292
60° 65°	— 1,64649 — 1,30010	- 0,80784 - 1,37557	1,39887	2,07116	1,13823
700	- 1,20010 - 0.51030	- 1,37557 - 1,66718	0,77428	2,09727	1,42703
75°	-0,51930	- 1,66718 - 1,63757	0,06711	1,95952	1,70821
800	0,24987	— 1,63757 — 1,0833	- 0,62696 - 1,31030	1,65412	1,95869
850	0,94795 1,43252	-1,29832 $-0,71589$	- 1,21020 - 1,50826	1,19840	2,15644
900	1,60565	0,00000	-1,59826 $-1,73431$	0,62955	2,28317
90	1,00303	0,00000	1,/3431	0,00000	2,32681

и	$R_{\rm o}^6$	$R_{\rm r}^6$	R_2^6	R_3^6	R_4^6	R_5^6	R_6^6
00	3,6056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
50	3,3210	1,3901	0,1952	0,0172	0,0010	0,0000	0,0000
100	2,5336	2,4581	0,7222	0,1303	0,0159	0,0013	0,0001
150	1,4247	2,9637	1,4214	0,4006	0,0752	0,0096	0,0007
200	0.2454	2,8089	2,0767	0,8303	0,2156	0,0374	0,0040
250	-0,7476	2,0605	2,4761	1,3562	0,4629	0,1039	0,0140
300	- 1,3548	0,9299	2,4709	1,8635	0,8171	0,2297	0,0384
35°	- 1,4815	-0,2847	2,0188	2,2157	1,2433	0,4310	0,0874
400	- 1,1571	- 1,2769	1,1971	2,2939	1,6733	0,7112	0,1729
45°	-0.5213	-1,8123	0,1843	2,0327	2,0174	1,0557	0,3058
500	0,2168	1,7860	-0,7865	1,4441	2,1845	1,4296	0,4935
55°	0,8373	1,2462	- I,4884	0,6211	2,1053	1,7806	0,7365
600	1,1680	-0,3754	- 1,7609	- 0,2798	1,7527	2,0468	1,0268
650	1,1283	0,5623	- 1,5524	- 1,0737	1,1539	2,1685	1,3469
700	0,7467	1,2961	- 0.9335	- 1,5920	0,3899	2,1003	1,6714
75°	0,1492	1,6213	-0,0793	- 1,7231	0,4172	1,8221	1,9696
800	-0,4802	1,4544	0,7767	- 1,4421	1,1284	1,3458	2,2106
85°	-0,9522	0,8535	1,4034	-0,8181	_ 1,6155	0,7151	2,3674
900	- 1,1267	0,0000	1,6328	0,0000	1,7886	0,0000	2,4218

26	$R_{\rm o}^7$	$R_{\rm I}^7$	R 7 2	R_3^7	R_4^7	R_5^7	R_6^7	R_7^7
00	3,8730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5°	3,4682	1,7009	0,2788	0,0291	0,0021	0,0001	0,0000	0,0000
100	2,3787	2,8789	1,0031	0,2154	0,0321	0,0034	0,0003	0,0000
150	0,9368	3,1881	1,8783	0,6389	0,1473	0,0241	0,0028	0,0002
200	- 0,4300	2,5741	2,5376	1,2558	0,4053	0,0915	0,0144	0,0014
25°	-1,3415	1,2859	2,6799	1,9038	0,8239	0,2430	0,0492	0,0062
30°	-1,5870		2,1839	2,3576	1,3533	0,5084	0,1287	0,0199
35°		- 1,4269	Company of the Compan	2,4143	1,8752	0,8897	0,2770	0,0520
400		- 1,9676		1,9779	2,2312	1,3469	0,5121	0,1152
45°		- 1,7148	— 1,1958	1,1079	2,2735	1,7964	0,8360	0,2242
500	1,1128	- 0,8295	- 1,7914	0,0146	1,9207	2,1256	1,2261	0,3918
55°	1,2333	0,3123	- 1,7169	THE THE RESERVANCE OF THE PARTY	1,1975	2,2224	1,6325	0,6252
600	0,8546		- 1,0327		0,2420	2,0100	1,9835	0,9213
650	0,1522		-0,0074		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	1,4769	2,1986	1,2644
700	-0.5833	1,4087	0,9791	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	-1,4582		2,2074	1,6264
75°	- 1,0606	0,5940	1,5700		- 1,7654		1,9682	1,9697
800		-0,4377	1,5583	0,6100	- 1,5642	The second state of the control of t	1,4819	2,2537
85°	-0,6868	- 1,2790	0,9587		- 0,9135		0,7965	2,4412
900	0,0000	- 1,6010	0,0000	1,6639	0,0000	— 1,8395	0,0000	2,5068

Abb. d. M. Ct. a. M. att. d. Wies, Min. Ed. A. Abba.

V. Beobachtete Werte der Komponenten der erdmagnetischen Kraft.1)

							X.						
λ		00	300	600	900	1200	1500	180°	2100	2400	2700	3000	3300
300		14031	16498	16367	15199	15866	17268	17314	14143	8909	4384	5639	9401
400		17808	20605	21590	21601	22142	23378	22455	20155	16180	12227	11209	13092
500		21992	25477	27628	28369	28324	27886		24060	22879	20394	17322	17281
600	na.	25943	29808	33290	34362	33284	30799	28075	27594	28704	28069	24036	21642
700		28462	32538	36080	37810	36100	33352	31167	30963	32962	32964	29129	25703
800		29857	32901	35288	38347	37887	35713	34174	33820	35521	35557	30780	28447
900		28143	THE RESIDENCE OF STREET	32950	36590	38573	37283	36414	35091	35306	34677	30482	28281
1000		24412	25548	28857	33558	36832	36714	36192	34798	33657	32702	29035	26297
1100		20900	21409	24251	28571	32996	34601	34220	32992	31559	29921	27395	24432
1200		19054	18126	19825	22852	26774	28866	29914	29916	28890	27553	26497	23361
1300		18429	15881	16252	17906	20322	22095	24561	26169	26174	26688	26697	23510
1400	00	18730	14685	13219	13014	14186	15610	19071	21646	22941	24851	27071	24443
1500	br.	18966	14275	10831	7735	7143	8867	12950	16558	19002	21945	25822	24340
130	00	10900	142/3	10031	1133	7143	0007	12930	10330	19002	21943	23022	24340
	00						Y.			der to			
	2	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	270 ⁰	3000	3300
300	01	5129	_ 240	3794	3037	— 656	- 1056	3865	7000	6140	— 636	- 7218	-8539
400	-		- 1008	3227	2940	- 1600	- 1566		7906	7176	748	- 6780	- 8665
500		6133	- 1931	2255	2940	— 1773	- 893		6975	7250	2084	- 5517	- 8366
600		-	- 2914	823	2604	- 1017	- 197	5187	5815	6583	2917	- 3771	- 8525
700	90		- 3803	- 210	1937	105	1378	5216	4581	5270	3503	- 1714	- 8901
800	0.0		-4663	- 924	1585	992	2497	5413	3674	3943	4156	134	- 8879
900		9800	- 5497	- 1804	905	1459	3426		3117	3193	5306	1064	- 8601
1000		10362	3111	- 2880	- 312	1157	3988	The state of the s	3760	3884	6386	1945	- 7873
1100		10634	— 7546	- 4131	- 2123	480	4402	5931	4735	4857	7091	2815	- 6760
1200		10217	- 9051	- 6093	- 4442	- 584	4400		5293	5615	8031	3881	- 5501
1300	00		- 9873	- 8281	- 6647	— 1778	3976		5642	6380	9713	5310	-4301
1400	-		-10019	- 9604	- 8291	- 3145	3221	6025	5841	7321	11107	6917	- 2857
1500	_		- 9720	10159	- 9240	- 3255	2047	5320	5907	8460	12349	8224	- 992
		1313				3 33		33					
							7						
			(T1) 6 X 1				Z.		in 81119	dieli	loagoen,	TO TA	
	2	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
14			•										
300		46564	47470	52326	55143	55994	51210	50096	56265	63181	57355	58943	51254
400		42791	41376	45359	50137	52300	45169	44086	50595	58197	63022	58287	47611
500		37500	34740	38037	42549	43701	36470	35100	41417	50698	57624	53404	43124
600		29764	25355	28025	32512	32819	26461	27156	33508	40909	48390	47750	37833
700	E I S	17432	12249	13670	17254	19874	16643	18614	24823	29793	35548	37572	31382
800		5355	- 696		1564	5777	5670	9056	13630	16037	21228	25448	21651
900		4056	- 13283		- 12602 ·	- 9029 -	110	- 2093	1025	2479	7297	13315	11446
1000	OELS.	11257	- 22887		- 25596 -			- 14812	- 11372	- 8815	- 4337	3187	2201
1100	-	17039						- 28714		- 20472	- 13584	- 5228	- 4813
1200								- 39947		- 31285	- 22585	- 12063	
1300	-	25829	- 34730	-43498	- 49757	- 56560	- 56510	- 50131	- 44261	- 40447	- 32384		
1400		31275						- 57005				- 28681	
1500	-	37016						- 63853		- 60636		- 38040	- 34363

¹⁾ Den Zahlen dieser wie aller folgenden Tabellen liegt die Einheit $0,1^5cm^{-\frac{1}{2}}g^{\frac{1}{2}}s^{-1}$ zu Grunde.

OTA CLE OTAL OCT - COL CLE OCT - CETT - OLOG - CETT -

VIa. Beobachtete Werte der Koeffizienten k und K in der Entwickelung von

X.									
u	k_0	k_1	K_1	k_2	K_2	k_3	K_3	k_4	K_4
30°	12930	- 1590	5180	2820	1110	- 50	- 70	— 130	- 10
35°	15690	- 2290	4970	2470	1240	- 100	140	- 90	- 50
400	18530	- 2650	4820	1590	1250	120	230	- 50	— 60
45°	21300	- 2640	4720	590	1280	360	440	20	- 70
500	23930	- 2360	4570	- 440	1330	510	690	110	- 100
55°	26520	- 2010	4410	- 1420	1320	560	790	270	10
600	28830	- 1710	3970	- 2210	1350	360	830	340	70
65°	30770	- 1550	3500	- 2660	1320	190	770	350	40
700	32290	— 1620	3030	- 2820	1190	140	710	330	60
75°	33400	— 1960	2470	— 2650	960	70	820	350	70
800	34070	- 2470	1930	- 2400	640	440	620	400	90
85°	34160	- 3240	1630	— 1980	150	460	480	370	110
900	33700	- 4220	1380	- 1720	- 280	310	380	200	160
95°	32730	- 5110	1100	— 1500	— 610	140	170	230	160
1000	31540	- 5830	660	- 1380	- 890	110	40	120	160
1050	30110	- 6380	70	<u> </u>	- 1320	50	30	70	40
1100	28600	- 6430	- 570	- 780	- 1340	- 40	- 10	- 190	- 20
1150	26850	- 5900	- 1530	- 530	- 1350	- 140	- 130	— 260	- 10
1200	25160	- 5080	- 2600	- 420	- 1290	- 250	- 230	270	60
1250	23580	- 3970	— 3760	- 470	- 1260	- 360	- 320	- 210	170
1300	22090	- 2620	- 4800	- 440	— 1220	- 420	- 460	- 170	180
1350	20600	- 1070	— 5730	- 340	- 1260	- 500	- 580	- 140	200
1400	19140	490	— 6580	- 130	— 1270	— 630	- 610	- 170	200
1450	17480	2210	— 7350	150	- 1130	- 740	— 600	- 230	160
1500	15720	3760	- 7710	420	- 800	— 720	- 600	- 230	140
						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	TO THE PROPERTY.		TO STATE OF THE PARTY OF

VI b. Beobachtete Werte der Koeffizienten l und L in der Entwickelung von

		15197		Sect on	<i>Y</i> .	10 1177			
и	l _o	Z ₁	L_1	12	L_2	13	L_3	14	L_4
30°	40	- 4350	1190	- 1070	4910	— 90	- 510	300	- 210
35°	60	- 4620	770	- 1090	5190	- 180	- 630	440	- 210
40°	110	- 4780	350	- 1230	5220	- 220	— 650	590	- 300
45°	150	- 4850	20	- 1420	4960	— 300	- 550	700	- 380
50°	150	- 4920	- 230	- 1580	4500	- 400	- 360	780	- 380
55°	120	— 5050	- 410	- 1710	3980	- 480	— 150	850	- 300
600	100	- 5180	- 520	— 1850	3390	— 560	90	870	- 150
65°	50	- 5300	- 570	- 1980	2740	- 710	310	780	20
70°	0	- 5400	- 630	- 2160	2110	- 930	500	700	170
75°	- 50	- 5530	— 670	- 2320	1500	- 1190	680	620	310
800	- 110	- 5670	- 750	- 2500	1000	- 1420	820	570	450
85°	- 150	- 5850	— 870	- 2600	580	- 1600	1030	520	530
900	— 130	- 6010	— 1130	— 2650	240	— 1700	1170	510	570

и	Z ₀	7,	L_1	\mathcal{I}_2	L_2	Z ₈	L_3	Z _i	L_4
95°	7-110	- 6170	<u>·</u> 1500	- 2650	10	- 1750	1270	490	570
1000	— 80	— 6370	- 2040	- 2610	- 130	- 1720	1320	390	530
1050	— 60	- 6520	- 2650	- 2460	- 260	- 1670	1340	270	440
1100	— 80	— 6670	- 3300	- 2310	- 450	- 1630	1320	170	330
1150	- 150	- 6770	- 4030	- 2110	- 690	- 1580	1310	130	250
1200	- 210	<u>- 6820</u>	- 4810	- 1910	- 940	- 1530	1330	160	200
1250	- 250	- 6780	- 5650	- 1710	— 1170	- 1460	1390	190	190
1300	— 280	— 6690	- 6490	- 1540	- 1340	- 1390	1510	210	220
135°	- 290	- 6520	- 7270	- 1400	— 1450	- 1350	1600	190	210
1400	- 200	— 6230	- 7940	- 1360	— 1530	— 1330	1630	190	180
145°	- 60	— 5830	- 8520	- 1390	— 1620	- 1190	1600	170	200
1500	140	· 5390	— 8980	- 1360	- 1700	- 950	1470	150	260

VIc. Beobachtete Werte der Koeffizienten m und M in der Entwickelung von

			5 - 6	Z.					
u	m_0	m_1	M_1	m_2	M_2	m_3	M ₃	m ₄	10 M4
300	53950	- 2530	- 3250	- 4910	220	900	— 720 —	- 990	- 110
35°	52470	- 2380	- 4540	- 5770	- 500	850	— 280 —	- 510	320
40°	50010	— 1750	— 5800	- 6820	- 1120	970	170 -	- 60	750
45°	46810	— 830	— 6590	— 7300	- 1290	1130	500	180	590
500	42940	170	— 6950	- 7210	— 1670	1280	- 20	400	700
55°	38850	740	- 7510	- 6840	- 2110	520	– 60	540	920
600	34270	1160	- 8430	— 6320	- 2580	0	— 640	250	810
65°	28750			- 5350			- 1270 -	- 250	540
700	22920		- 10230				— 1530 —		400
75°	16760						- 1690 -		270
800	10430	CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE C			A CAPPLE AND THE		- 1850 - 		170
85°	4050						- 1980 -		10
900	- 2250						— 2260 —		- 70
95°	- 8220		- 12280				— 2480 —		- 140
1000	- 13770	3180	- 12810				- 2440 -		- 150
1050	- 19050	5060	- 13450	1220	-3780	- 1000	— 2360 —	- 60	20
1100	- 24030	7380	— 13850			- 1230	THE PROPERTY OF STREET STREET,	140	20
1150	- 28430	9560	- 13590				- 2170	450	
1200	- 32450	11520	- 13180			— 1690	MEDICAL SERVICE STREET, STREET	380	290
1250	- 35980	12820	- 12130			- 1560		150	510
1300	- 39380	13870	- 11150	1590	— 168o	— 1650	- 2030 -	- 180	410
1350	- 43030	14800	— 10680	2100		- 2360		240	90
1400	— 46370	15220	- 9140	2260		- 2360		70	280
1450	- 49030	14830	- 6330				— 1730 –		200
1500	- 52210	14780	- 3710	2120	2160	1920	- 700 -	- 390	- 170

13.9

N. MOSE

VII. Koeffizienten der zur Darstellung der Kraftkomponenten dienenden Reihen.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

105° -- 1070 -- 2050 -- 2050 -- 200 -- 1070 -- 200

	OLL 07	$a X \sin v$				βY s	in v	061	γZ
	OF I OF	II.	III	IV	0121 I 0101	0185 — 0282 II	OBJO III	IV	
p 0 0	21093,3	21255,0	21278,8	21278,8	0 1400 0 1300	_ 19.7	0	_ 50,0	0
p 1 0	363,6	323,0	361,1	361,1	006170	139,4	0000	66,7	36388,2
p 2 0	-10152,0 -	-10281,4 -	-10234,7	-10234,7	0	93,4	0	34,1	701,4
p 3	— 881,7	— 980,1	- 932 _{,8}	- 932,8	o Koeffiziente	39,7	o .	— 37,5 Section 8	— 1412,1
p 6	682,7	649,4	695,3	695,3	0	49,2	0 .	- 9,1	— 1272,6
p 6	493,4	494,7	534.8	534.8	0	118,1	0	4,8	291,4
p 6	- 122,3	— 167, ₆	— 132, ₉	— 132, ₉	0101 -007	44,2	0	0,2	40,0
P.	17,3	7,9	17,7	17,7				LEGAL.	101 4-1 5-4 6-4
	OSON OA	60	5.50 5	0.15	0180 - 01		pri o		
p_1^1 q_1^1	-1724,7 433,8	-1932, ₃ 436,1	-1831,9 431,1	-1920,9 438,4			3414,4 —1294,3	Control of the Contro	2847,4 — 6880,6
p_{1}^{2} q_{1}^{2}	272,1 1759,1	270,4 1752,0	268,6	258,4 1735,5	323.3 1285,5	327,2 1272,1	321, ₃ 1365, ₄	329,5 1260,9	- 3840,6 965,9
p ₁ ³ q ₁ ³	784,1 — 545,9	752,1 — 449,5	814,7 — 457,4	788,5 — 442,0	111,6 476,8		— 443,1		1899,7
P 1 9 1 9 1	- 997,7 91,0	- 899,9 162,5	- 956,1 112,7	- 924,4 128,7	- 97,0 182,5	— 125,6 189,1	- 61,7 201,2	- 120,8 166,1	- 908,8 - 483,4
\$\begin{pmatrix} p & 5 & 1 & 2 & 5 & 1 & 2 & 5 & 1 & 2 & 5 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2	293,8		274,7	226,9	86, ₁ 101, ₅	91, ₂ 147, ₉	92,8	61,3	- 606,7 514,6
P 6 1 9 6 9 1	251,1 — 212,9	313,4 — 167,0	257,5 — 229,6	273,9 — 221, ₃	- 28,9 18,9		- 30,4 35,1		— 132,0 — 201,7
p ₁ ⁷ q ₁ ⁷	56,3 86,1	— 13.9 81,4	104,5	54,6 95,6					

sales descriptions and

	LIY al	a	$X \sin v$	and i, il.	A Hypothes	gov sine	Y sin v	arefull .	a IIIX
	VII	JII II	n III	IV	I	111	II III	I	27
$p_{\frac{2}{2}}^{2}$ $q_{\frac{2}{2}}^{2}$	-831,8 $-20,5$	-784,3 - 54,2	-792,1 - 11,3	782,7	-1333,1 642,8	-1246,5 481,8	-1257,4	-1246,8 482,8	959,3
p_2^3	—106, ₁	—174,9	19	— 54,1 — 170 a		441	494,6	ATE TO	-1989,5
$q^{\frac{2}{3}}$	662,6	607,0	-203,1 582,6	-179,3 605,7	- 27,2 1100,4	1054,9	— 15,0 1047,8	1051,5	-2190,9 $-54,1$
\$\frac{1}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2}	531,0 61,5	387,0	393,1	395,5	145,4 320,0	96, ₂ 366, ₉	9357.4	94.6 372,4	- 796,6 362,1
⊅ ⁵ ₂ 5	374,7	385,5	361,3	372,4	31,6	- 2,1	17,2	- I,3	- 409,6
92	-170,4	- 109,9	-136,7		137,1	233,3	212,0	215,6	94,5
\$\begin{pmatrix} p\frac{6}{2} \\ q\frac{6}{2} \\ \end{pmatrix}\$	162,1 - 37,4	221,4	250,7 — 20,3	252,1 — 18,6	- 22,0 $-$ 48,3	- 57,8 - 21,7	- 27,8 - 19,4	- 63,7 - 2,0	- 76, ₇
$p_{\frac{7}{2}}^{7}$ $q_{\frac{7}{2}}^{7}$	- 69,6 31,7	13,9	- 28,0 40,1	- 20,7 52,0	12		11.T	ar —	101.1 "281
7.		1213-	18 -	854	10 14 10	401 mm	484 484	020 000	145°C
\$\begin{pmatrix} p & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 &	173.0	72,6 166,3	158,9	70,7	— 821,7 439,2	- 749,3 516,0	- 740,5 506,3	- 749,2 517,6	111 × 582,5 1089,4
\$\psi_3^4 \qq_3^4	134,4	129,9	150,8	125,2	260,0 — 311,4	204.5 - 317,5	214, ₂ — 286, ₀	202,3 — 311,6	516,5 431,2
P 3 9 5 3	17.8 — 59.9	- 70,4 - 51,6	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	- 84,6 - 57,0	- 41, ₂	II,1	- 0,9 22,4	12,2	- 29,6 - 82,0
p 6 8	10,8	48,6	16,2	14,3	78,3	- 13, ₂ 32, ₈	49.0	16,7	423,3
93	29,8	2,9	0,7	- 0,9		— I23,5	- 101,6	— 80, ₉	182,0
\$\begin{pmatrix} p & 7 & 8 & 7 & 7 & 8 & 7 & 7 & 8 & 7 & 7	-165,0 - 70,9	5,8 - 0,4	92,0 - 44,4	- 68,6 - 28,5	O.	70 78 01	61 11 27 11		600 600 526 900
44	26.	107		008		###	2.20	1 Egm Sterm	toor
94	- 26,9 35,1	83,9 45,8	44,6	84,3	91,7 152,5	273.9 160,9	239,3 181,9	275,0 160,0	- 189,5 114,0
\$\frac{p_4^5}{q_4^5}\$	99,0	104, ₂ — 17, ₄	42,4 —100,3	107,1	77.6 59.6	— 129,5 — 81,0	— 98, ₇	83,8	— 88, ₉ 115, ₈
P 4 9 4	27,8 — 36,3	- 51,2 - 1,0	- 46,1 - 49.7	- 44,9 - 49,7	— 81,1	— 107,3 67,8	- 42,9 19,1	- 91, ₁ 54, ₄	141,2
	— 50,0 — 71,3			14,7	micews ento n	Medal asha	autor office		all add T
94	71,3	damil un	26,5	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	eral desce energy				

XIII a. Differenzen der nach den 4 Hypothesen I, II, III, IV der Tabelle VII berechneten Werte von k_1 und K_1 mit den beobachteten.)

			k_1				K_1	
24	I	II	III	IV	I	II	III	IV
300	59	418	9	291	650	165	540	403
35 ⁰	- 94	112	- 15	131	388	- 29	180	91
400	-266	— 87	— 88	- 5	228	-121	- 43	- 96
45 ⁰	-341	-139	-144	— 62	185	- 97	-107	-137
500	—361	- 92	-182	— 60	178	— 37	- 91	-108
55°	-406	- 85	-254	— 78	253	108	47	37
600	-459	- 40	- 320	-100	129	59	17	S. BOCII
65°	-487	- 39	-335	- 95	34	42	30	30
700	-491	- 27	-298	— 67	- 37	53	69	76
75°	-475	— 27	-224	- 23	-206	— 38	- 6	10
800	-335	68	— 46	114	—381	-147	-117	- 93
85° 90°	-291	109	53	179	-345	— 66	— 55	- 25
900	-342	48	0	109	-262	30	13	43
95°	-337	52	— 35	74	-167	99	54	77
1000	-325	55	— 98	25	-132	65	5	14
1050	417	— 67	-281	-144	— 88	- 2	— 54	— 65
1100	-367	— 81	- 313	-175	99	44	26	7
1150	-139	37	-137 - 34	- 21	161	- 48	- 9	— 63
1200	- 30	37	- 34	38	264	- 80	20	- 50
1250	- 11	— 75	26	46	346	-107	56	— 21
1300	— 80	-144	38	21	498	9	194	121
1350	-198	-164	15	9	578	140	292	232
1400	—471	-161	-174	- 91	440	151	196	159
1450	659	134	-317	— 44	2	— 37	-181	-189
1500	-996	480	-665	— 99	-428	-133	-542	-517

XIII b. Differenzen der nach den 4 Hypothesen I, II, III, IV der Tabelle VII berechneten Werte von l_1 und L_1 mit den beobachteten.

	45.05		l ₁ sees		4,651	2,071	$\mathcal{L}_{\mathbf{t}}$	LEEL
	1 1	II	III	IV	I	II	III	IV
300	224	93	- 20	213	234	- 16	-543	66
35°	59	- 43	-129	33	234	16	-439	29
400	17	— 68	-118	— 33	185	1	336	- 30
45 ⁰	73	— 6	- 15	- 7	161	6	-344	- 42
500	133	50	84	22	146	11	-299	— 31
55 ⁰	131	40	III	— 6	132	5		— 17
600	125	23	121	- 29	134	0	-229	4
650	122	15	124	— 34	163	6	—17I	32
700	132	28	129	- 10	175	- 21	-130	18
75 ⁰	111	20	95	— 2	228	- 17	- 49	21
800	84	14	47	10	287	- 11	— 41	13
850	25	- 15	— 36	— 5	405	29	159	30
900	0	- 8	- 86	11	406	25	221	I
950	- 11	12	-118	31	390	22	263	- 20
1000	- 48	3	-172	7	356	— 35	301	— 83
1050	- 31	22	-166	16	311	- 51	189	- 88
1100	- 24	24	-160	- 4	301	- 11	185	— 22
1150	9 45 107	33	-122	- 16	272	22	155	47
1200	45	31	- 70	- 33	235 163 95 75	48	III	109
125 ⁰ 130 ⁰ 135 ⁰ 140 ⁰	107	43	14	- 25	163	27	33	112
1300	138	17	73	- 37	95	- 12	- 35	70
1350		— 20	124	- 40	75	— 38	- 46	5
1400	210	- 23	209	14	133	— 23	34	— 65
145 ⁰ 150 ⁰	290	11	321	125	236	- 4	174	-175
1500	348	32	409	242	397*	- 42	387	-299

¹⁾ Um für alle folgenden Tabellen eine zweckmässige Anordnung zu gewinnen, habe ich Tabelle XIII an dieser Stelle, an der sie übrigens auch ihrem Inhalte nach allenfalls stehen kann, eingeschoben. Eine Aenderung der Numerierung war leider nicht mehr möglich, da der Druck des Textes abgeschlossen war.

- 68

— 28

VIII. Endgültig gewählte Koeffizienten der Reihen zur Darstellung von $\alpha X \sin v, \ \beta Y \sin v, \ \gamma Z.$

			а	$X \sin v$			
m; n:	0	I	2	3	4	5	6
0	21280,69	360,49	-10235	- 933	695	535	-133
I	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	-1920,01 437,63	259 1736	789 — 442	-924 128	227 10	274 —221
2			-781,26 $-55,56$	— 180 606	396 50	373 —113	252 — 19
3				71,12 166,22		— 85 — 57	I4 I
4					84,21 41,60	107 — 14	— 45 — 50
		E mis 1.64 — 18 13 a nis 5.61 —	Sera e del California			-1-11-6	4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
				$Y\sin v$			
m; n:	0	I	2	3	4	5	6
0 .	- 49 ₁₀₃	66,10	34	- 37	- 9	- 5	0
I		-3420,98 -1276,66	329 1261	132 — 495	— 121 166	61 170	— 7 — 38
2			-1247,79 482,55	23 1051	94 37 ²	— I 216	— 64 — 2
3		W. FO.		- 748,11 516,70	202 — 312	1 2 5	8o
4		4.01			274,08 160,20	109 — 84	— 92 55
			d + 12 ft - 14	#8 - "A 4 H	4 12 0 80 4	eres -) 5	17° — 18°
				γZ			
m; n:	0	1	2	3	4	5	6
0	0	36388	701 -	-1412	— I 273	291	- 40
I	A Garage	2847 — 6881	-3841 966		— 909 — 483	-607 515	-132 -202
2			• 000	-2191 - 54	- 797 362	-410 95	168 — 77
3				- 583 -1089	517 431	— 30 — 82	423 182
4					— 190 114	- 89 116	141 201
Abh.	d. II. Cl. d. k	. Ak. d. Wiss.	XIX. Bd. I. Abt	h.			8

IX. Koeffizienten der Reihen zur Darstellung von

U, W und V: b.

 $(b = 6,356.10^8 cm)$

 U_{0}

m; n:	0	I	2	3	4	5	6
0	0	-18429,6	- 232,7	354.0	276,6	— 53,0	6,0
T		— 1164,1 3484,7	1202,1 — 304,6	-407.7 - 92.9	147,8 61,8	110,8 — 89,3	18, ₅ 32, ₃
2		8.8 Öp.	308,6 718,2	527,3	189, ₄ — 28.9	106,5 — 8,0	- 7.3 18,0
3			1 SILVER	140,5 225,9	-100,2 $-54,9$	6,4 - 0,5	-25,0 -10,3
4	4.5	701			101.9	- 24,1 - 26,7	6, ₁ 12, ₆

 $U = U_0 + \Pi_1 \cdot (-532,0 \cos \lambda + 50,1 \sin \lambda) + \Pi_2 \cdot (30,9 \cos 2\lambda - 45,4 \sin 2\lambda) + \Pi_3 \cdot (-200,5 \cos 3\lambda + 156,2 \sin 3\lambda) + \Pi_4 \cdot (90,2 \cos 4\lambda - 15,0 \sin 4\lambda).$

 $W_{\rm o}$

m; n:	0 0	I	2	3	4	46x 5	6
0	. 0	-18429,6	- 232.7	354,0	276,6	- 53,0	6,0
I	86	— 1276,7 3421,0	1261,0 - 329,0	-495,0 -132,0	166,0	170,0 — 61,0	-38,0 7,0
2			241, ₃ 623, ₉	525.5 — 11,5	186,0 - 47,0	108,0	- 1,0 32,0
3	- N		and the	172,2 249,4	- 104,0 - 67,3	- 1,7 - 4,0	-26,7 $-5,3$
4		40 P 65 P 6			40,1 — 68,5	- 21, ₀ - 27, ₃	13,8

 $W = W_0 - \lambda \left(-49,03 + 66,10 R_0^1 + 34 R_0^2 - 37 R_0^3 - 9 R_0^4 - 5 R_0^5 \right)$

V:b

m; n:	0	TOTAL I	2	3	4	5	6
0	0	-18429,6	- 232,7	354,0	276.6	- 53,0	6,0
I	881	- 1220,4 3452,9	-316,8	-451.3 -112.4	156,9 91,4	140,4 - 75,2	- 9,8 19,6
2			274.9 671,1	526,4 4,9	187,7 — 38,0	107,3 — 3,8	- 4,1 25,0
3				156,4 237,6	-102,1 - 61,1	- 4,1 - 2,2	$\frac{-25.8}{-7.8}$
4					- 7 ¹ ,0 - 26,4	- 22,5 - 27,0	9,9 17,8

X. Koeffizienten der Reihen zur Darstellung von

00076823

 $V_i: b, V_a: b \text{ und } a \beta b i.$ $(b = 6,356 \text{ 10}^8 cm)$

 $V_i : b$

m; n:	0	B. A. L. I	2	2.7012 3	4 850	5	6
0	0	-18321,5	- 233,8	354,2	264,9	- 50,6	5,9
ı		— 1360,4 3455,4	1264,0 — 320,7	-465,9 -112,0	171,1 94,5	119, ₂ — 81, ₂	5,7 24,6
2			302,8 668,5	540,0 9,9	172,4 — 57,3	86, ₂ — 10, ₄	-14,9 17,5
3		244.6 549.4 244.6 549.4	D.COLLE	150,8 258,3	-103,1 $-75,2$	4,6 6,5	-44,6 -17,7
4		150,000 150,00	5.2 NO 55 8.2 NO 55 8.4 O 51	AND LET TO SEE	52,8 — 24,5	- 2,1 - 22,9	-6,3 $-7,3$
Sec.		14.18	10 F-2461 - 10			20, 84,9283	Wat I

 $V_a:b$

m; n:	0	1,512	2	3	4	5	6
0	0	— 108, ₁	1,1	- 0,2	11,7	- 2,4	0,1
I		- 140,0 - 2,5	32,4	14,6 — 0,4	- 14,2 - 3,1	21, ₂ 6, ₀	-15,5 - 5,0
2		9,021- 4,001- 9,00 - 1,23,011- 1,00 - 1,	- 27,9 2,6	— 13,6 — 5,0	15,1	21,1 6,6	10,8 7,5
3				5,6 — 20,7	I,0 I4,1	- 0,5 - 8,7	18, ₈ 9. ₉
4	Rousiesion	wing 185 mi to	hou ved	der Koeifizien	18, ₂ — 1, ₉	— 20,4 — 4,1	16, ₂ 25, ₁

aßbi

m; n:	0		2	3	4	5
0	0	6,8	- 20,4	- 5,7	- 4,0	0,0
I 2		— 3,8 — 33,3	- 2,9 3,3 12,3 2,9	- 15,6 - 39,7 - 16,1 14,2	- 22,9 47.9 - 14,7 2,5	24,4 - 54,5 - 28,2 12,7
3				- 5,7 - 9,5	3,5 — 4,7	5,5 — 1,8
4		E.COOR - S.			— 0,7 4,1	— 13,3 9,8 8*

XIa. Berechnete Werte der Koeffizienten k und K in der Entwickelung von

				X.	1911 191) 9				
и	k ₀	k_1	K_1	k_2	K_2	k_3	K_3	k_4	K_4
00	0,0	2579,5	4257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	1907,5	2371,6	4273,5	1170,3	260,8	- 21,7	- 2,2	0,5	0,1
100	3870,8	1783,7	4322,1	2202,2	501,1	- 80,2	- 6,1	3,6	1,0
150	5939,3	915,3	4403,6	2975,8	705,4	-158,1	4,9	11,7	2,8
200	8149,4	- 89,2	4515,1	3404,3	866,9	-231,2	10,6	26,2	4,7
250	10520,1	-1070,0	4646,4	3446,0	988,1	-275,3	49,0	47,4	5,0
300	13049,1	- 1881,4	4777.4	3107,5	1079,2	-272,2	115,8	74,9	1.9
35 ⁰	15712,4	-2420,5	4878,9	2442,3	1153,8	-214,8	210,9	107,6	- 6,2
400	18463,1	-2645,2	4916,4	1541,5	1223,0	-108,7	328,2	143,8	- 19,3
450	21235,5	-2577,7	4856,9	519,8	1291,2	29,2	456,1	181,9	- 35,9
500	23947,8	-2299,6	4677,6	- 500,8	1352,8	174.9	579,7	220,0	- 52,1
55°	26508,5	1931,9	4373,0	1408,6	1392,2	303,2	683,5	256,7	- 63,1
600	28822,6	-1609,6	3958,7	-2116,6	1387,2	393,8	754.2	289,9	- 63,4
650	30799,3	-1454,8	3470,1	-2573,2	1314,8	435,6	783,6	317,4	— 48,9
700	32359,8	-1552,7	2954.5	-2766,0	1157,4	428,7	769,4	336,6	- 17,8
75°	33444,6	-1937,0	2460,2	-2720,4	909,0	383,5	714.9	344,1	27.9
800	34019,9	-2584,2	2023,1	-2490,7	578,7	316,3	628,2	336,7	82,7
850	34081,1	-3419,2	1655,0	-2148.5	190,6	244,6	519,4	311,5	138,2
900	33655,5	-4329,3	1337.5	-1768,7	- 219,6	181,8	398.5	266,8	184,4
950	32799,6	-5184,0	1023,3	-1415.4	- 611,0	133,4	273,7	202,9	211,8
1000	31594,0	-5855,2	645,7	-1132,0	- 945,3	95.8	150,0	122,4	213,5
1050	30135,1	-6236,2	134,9	- 935,3	-1194,4	58,0	29,6	30,8	187,1
1100	28524,0	-6254,6	- 562,6	- 816,3	-1345,3	5,7	- 87,3	- 64,4	135,0
1150	26853,6	-5878,8	-1466,5	- 745,0	-1401,9	- 73,2	-200,5	-154,0	64,5
1200	25199,7	-5117,9	-2550,2	— 680,7	-1383,1	-184,1	-308,1	-229,1	- 13,6
1250	23600,7	-4015,5	-3739,4	- 583,4	-1316,6	-322,0	-405,9	-282,1	- 87,0
1300	22072,9	-2641,2	-4920,8	- 424,8	-1232,2	-471,5	-486,9	-307,8	-144,9
1350	20589,2	-1079,1	-5962,4	- 196,1	-1154,0	-609,3	-542.7	-305,4	-179,5
1400	19095,0	581,4	-6739,3	88,4	-1094,6	-709,6	-565,2	-277,7	-187.9
1450	17516,2	2253,6	-7161,0	393,8	-1053,1	-750,6	-549,1	-231,0	-172,5
1500	15772,7	3858,8	-7192,8	672,4	-1016,2	-721,0	-494.2	-174.4	-139,8
1550	13794.3	5328,6	-6867,4	872,9	- 963,1	-623,2	-406,7	-117,1	98,9
1600	11534,1	6606,4	-6281,0	953.7	- 872,3	-474,7	-298,7	- 67,5	- 59,3
165°	8980,1	7646,5	-5577,3	891,8	- 728,3	-304,9	-186,9	- 31,2	- 28,2
1700	6158,6	8414,2	-4918,7	689,6	- 526,9	-148,8	- 89,6	- 9,9	- 9,1
1750	3134,1	8884,6	-4453.9	375,8	- 277,2	- 39,3	- 23,4	- 1,3	- 1,2
1800	0,0	9043,1	-4286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						UK STORY	The latest		Section Control of

XI b. Berechnete Werte der Koeffizienten ℓ und L in der Entwickelung von

		n. i		Y					
24	6	1,	L_1	l_2	L_2	13	L_3	14	L_4
00	0,0	-4257,5	2579,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	33,0	-4267,4	2530,4	- 261,5	1182,9	2,3	- 21,9	- 0,1	0,5
100	64,0	-4296,2	2386,0	- 506,2	2300,7	7,9	- 83,5	- 1,0	3,6
150	91,3	-4342,8	2155,9	- 720,5	3293,6	13,5	-173,6	- 2,3	11,4
200	113,3	-4404,6	1855,0	- 896,5	4111,7	13,8	-275,5	- 2,4	24,8
250	129,0	-4478,9	1503,2	-1033,1	4719,1	3,1	-369,9	1,8	43,3
300	137,4	-4562,5	1123,7	-1136,9	5095,7	- 24,8	-438,1	15,1	65,2
35°	138,6	-4652,6	741,4	-1219,8	5238,9	- 74,7	-464,7	42,5	87,9
400	132,6	-4746,7	380,4	1297,2	5161,7	- 149,7	-440,4	88,7	108,5
45 ⁰	120,1	-4843,5	61,9	-1384,8	4891,7	- 251,0	-362,8	156,4	124,5
500	102,2	-4942,4	- 198,6	-1494,9	4466,5	- 377,0	-236,7	245,6	134,6
55°	79,9	-5044,4	- 393,3	-1634,4	3930,8	- 523,9	- 72,3	352,5	138,9
600	54,6	-5151,2	- 523,8	-1802,7	3330,8	- 685,8	115,9	469,8	139,2
650	27,7	-5265,6	- 601,6	-1991,9	2710,6	- 856,1	312,4	587,0	138,7
700	0,2	-5390,4	- 647.7	-2187,5	2108.2	-1027,0	503,4	691,9	141,7
75°	- 26,6	-5528,1	- 690,5	-2371,0	1552,9	-1191,2	678,2	771,8	152,5
800	— 52,1	-5679,9	- 763,4	-2523,0	1063,7	-1342,0	830,8	815,8	174,5
850	— 75,7	-5845,3	- 900,2	-2626,4	648,9	-1473,8	960,2	816,3	209,6
900	— 96,8	-6021,1	-1131,5	-2669,7	307,2	-1582,2	1069,5	770,3	257,5

				Y						
14	Z ₀	l_1	L_1	l_2^{not}	L_2	18	L_8	14	L_4	
950	-115,5	-6201,1	-1480,0	-2648,2	29,4	-1663,8	1164,0	680,3	315,4	
1000	-131,7	-6376,6	-1957,5	-2565,6	- 198,5	-1716,6	1249,6	553,9	378,2	
1050	-145,3	-6536,0	-2562,1	-2432,9	- 392,9	-1739,3	1330,1	403,3	439,1	
1100	-156,6	-6666,3	-3277,9	-2266,3	- 569,0	-1731,0	1406,0	243,2	490,7	
1150	-165,4	-6754,1	-4076,5	-2084,7	— 738,6	-1691,7	1473.8	89,1	525,9	
1200	-171,7	6787,0	-4919,2	-1906,1	- 907,8	-1621,6	1525,9	- 44,7	539,8	
1250	-175,5	-6755,1	-5762,0	-1744,8	-1076,5	-1521,9	1551,9	-147,5	527.7	
1300	-176,4	-6653,0	-6560,3	-1608,5	-1238,1	-1394.6	1540,5	-213,1	491,4	
1350	-174,2	-6480,4	-7274,6	-1498,0	-1380,5	-1243,1	1482,6	-240,9	433,5	
1400	-168,6	-6243,5	-7875,1	-1406,7	-1488,4	-1072,2	1373,0	-235,1	360,2	
1450	-159,3	-5954,6	-8344,9	-1322,3	-1545,5	— 888,5	1212,9	-203,7	279.4	
1500	-146,1	-5631,7	-8681,4	-1229,6	-1537,1	- 700,1	1010,6	-157.6	199.4	
1550	-129,2	-5297,4	-8895,8	-1113,8	-1452,8	- 516,4	781,6	-107,4	128,2	
1600	-108.5	-4976,7	-9010,5	- 963,2	-1288,2	- 347,4	546,6	- 62,5	71,5	
1650	- 84.6	-4694.8	-9054,5	- 771,8	-1046,5	- 203,8	329,6	- 29,0	32,2	
1700	- 58,0	4474,6	9058,3	- 541,0	- 738,6	- 93,0	153,9	- 9,2	10,0	
1750	- 29.5	-4334,6	-9048,5	- 279,1	- 382,1	- 23,6	39,7	- 1,2	1,3	
1800	0,0	-4286,5	- 9043,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

 \mathbf{XIc} . Berechnete Werte der Koeffizienten m und M in der Entwickelung von

4 4				Z.					
14	m_0	m_1	M_1	m_2	M_2	m_3	M_3	m_4	M_4
00	57859,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	57788,7	- 1386,6	- 578,1	- 180,2	- 6,8	8,4	2,7	0,1	0,3
100	57563,7	- 2572,0	- 1159,3	- 704,1	- 28,2	63,5	19,9	1,3	4,2
150	57147,6	3391,9	- 1750,3	-1523,2	- 66,5	196,3	60,4	5,8	20,0
200	56483,3	- 3748,3	- 2362,6	-2559,7	- 127.3	410,6	121,9	16,1	58,0
250	55499,1	- 3624,7	- 3012,3	. 3712,3	218,9	679,6	190,9	32,6	126,2
300	54116,0	- 3086,9	- 3714,9	-4864,3	- 353,3	951,4	244,4	52,9	227,0
35°	52255.5	- 2266,5	- 4480,3	-5895,0	- 544,6	1161,5	255,4	70,8	354,2
400	49848,8	- 1332,0	- 5307,2	-6692,4	- 806,3	1249,9	199,9	77,3	492,9
450	46843,5	- 455,2	- 6179,2	-7167,2	-1148,0	1177,9	63,0	62,1	621,8
500	43210,9	223,1	— 7066,6	-7264,8	-1571,2	938,2	- 156,1	16,6	717,7
55°	38951,2	618,6	— 7930,3	6973,3	-2065,7	559,5	- 443,3	63,4	760,1
600	34095,7	717,5	- 8731,2	-6326,0	-2608,4	99,5	- 772,4	-175,6	737,1
65°	28709,1	577,1	- 9439,8	-5397,1	-3163,3	— 368,2	-1110,6	-309,9	648,1
700	22884,9	311,3	-10044,4	-4290,3	3686,0	- 771,7	-1425,6	-449,9	504,7
75°	16743,8	68,1	-10555,0	-3122,4	-4128,7	-1058,2	-1692,4	-575,1	329,4
800	10422,6	1,1	-11001,0	-2005,3	-4447,6	-1206,2	-1898,4	-6646	150,7
850	4067,7	242,6	-11421,0	-1028,5	-4610,5	-1229,2	-2044,4	-701,3	- 2,6
900	- 2178.1	881,1	-11851,9	- 247,0	-4601,8	-1171,3	-2142,8	-676,0	-107,0
950	- 8187,3	1948,6	-12311,0	324,5	-4426,1	-1093,9	-2211,7	-588,9	-149,1
1000	-13858,1	3417,1	-12784,0	708,4	-4106,9	-1058,7	-2269,1	-450,6	-128,3
1050	-19123,1	5205,1	-13220,7	954,5	-3682,9	-1110,4	2325,7	-279,8	- 55,6
1100	-23953,8	7189,9	-13535,8	1124,4	-3201,1	-1264,4	-2381,3	-100,1	48,7
1150	-28361,5	9225,8	-13622,1	1274,7	-2708,9	-1502,3	-2423,5	64,5	160,1
1200	-32389,8	11159,9	-13375,9	1443,2	-2246,6	-1775,7	-2431,4	194,0	255,4
1250	-36107,0	12848,5	-12716,7	1639,7	-1841,4	-2019,5	-2380,9	276,3	317.3
1300	-39589,5	14167,8	-11613,7	1845,6	-1505,2	-2168,5	-2252,2	308,1	337.7
1350	-42908,5	15021,1	-10099,9	2020,3	-1235,2	-2175,0	-2037,2	295,2	318,0
1400	-46113,0	15341,7	- 8276,1	2114,3	-1018,1	-2021,2	-1743,2	249,9	267,9
1450	-49219,4	15093,4	- 6299,3	2084,8	- 835,6	-1724,8	-1393,7	188,0	201,5
1500	-52204,6	14269,2	- 4358,1	1910,2	- 670,7	-1334,1	-1024,4	124,5	133,7
1550	-55005,8	12889,1	- 2639,7	1599,0	- 512,8	- 915,9	676,1	70,9	76,3
1600	-57528,6	10998,7	- 1293,6	1191,6	- 360,1	- 538,2	- 385,6	33,1	35,7
1650	-59659,7	8667,0	- 402,0	754,1	- 219,5	- 252,4	- 176,9	11,6	12,5
1700	-61284,2	5983,3	38,9	364,5	- 103,7	- 80,6	- 55,7	2,5	2,7
1750	-62303,4	3054,6	119,4	95,8	- 26,9	- 10,6	- 7,2	0,2	0,2
1800	-62651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

XII a. Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten der Koeffizienten k und K.

			(BeobBer.)			A LUCZAN - LITTER TO LETTER TO				
14	k_0	k_1	K_1	k_2	K_2	k_3	K_3	k_4	K_4	
300	-119	291	403	-288	31	222	-186	-205	— 12	
35°	— 22	131	91	28	86	145	— 7I	-198	- 44	
400	67	- 5	- 96	49	27	229	- 98	- 194	- 41	
45°	65	- 62	-137	70	— II	331	- 16	-162	- 34	
500	- 18	- 60	-108	61	— 23	335	110	-110	- 48	
55°	12	- 78	37	— 1 I	— 72	257	107	13	73	
600	2007	-100	TOO II	— 93	- 37	- 34	76	50	133	
65°	- 29	- 95	30	- 87	5	-246	- 14	33	89	
700	- 70	- 67	76	- 54	33	-289	- 59	— 7	78	
750	- 45	- 23	10	70	5 I	-313	105	6	42	
80°	50	114	- 93	91	61	124	- 8	63	7	
85°	79	179	- 25	169	- 41	215	— 39	58	- 28	
90°	44	109	43	49	- 60	128	- 19	- 67	- 24	
95°	- 70	74	77	- 85	I	7	-104	27	— 52	
1000	- 54	25	14	-248	55	14	110	- 2	- 54	
1050	— 25	-144	— 65	-205	-126	— 8	0	39	-147	
110° 115° 120°	76 - 4 - 38	-175	7	36	5	- 46	77	-126	-155	
1150	- 4	- 21	- 63	215	52	— 67	70	-106	- 74	
1200		38	- 50	261	93	— 66	78	- 41	74	
1250	— 2 I	46	- 21	113	57	- 38	86	72	257	
130 ⁰ 135 ⁰	17	2 I 9	121	- 15	12	51	78 86 27 — 37	138	325	
135°		9	232	-144	-106	109	— 37	165	379	
140° 145°	45	— 91	159	-218	-175	80	- 45	108	388	
1450	- 36	- 44	-189	-244	— 77	11	51	1	332	
1500	- 53	- 99	-517	-252	216	I	-106	- 56	280	

XII b. Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten der Koeffizienten / und L.

3 7	4.050	*11.00k/m		(B					
u	Zo	l_1	L_1	l_2	L_2	23	L_3	14	L_4
30°	-97	213	66	67	-186	— 65	— 72	285	-275
35°	-79	33	29	130	- 49	-105	-165	398	-298
400	23	— 33	-30	67	58	- 70	-210	501	-408
45°	30	7	-42	- 35	68	- 49	-187	544	-504
50°	48	22	-31	— 85	33	- 23	-123	534	-515
55°	40	- 6	-17	- 76	49	44	- 78	497	-439
600	45	— 29	4	- 47	59	126	 26	400	-289
65°	22	- 34	32	12	29	146	_ 2	193	-119
700	0	- 10	18	27	2	97	- 3	8	28
75°	-23	- 2	2 I	51	— 53	I	2	-152	158
800	-58	10	13	23	- 64	- 78	— 11	-246	276
85°	-74	— 5	30	26	- 69	-126	70	-296	320
900	-33	11	I	20	- 67	-118	100	-260	312

и	Ž ₀	4	L_1	72	L_2	43	L_8	14	L_4
95°	6	31	— 20	— 2	- 39	— 86	106	-190	255
1000	52	7	- 83	- 44	69	— 3	70	-164	152
1050	85	16	— 88	- 27	133	69	10	-133	I
1100	77	- 4	- 22	- 44	119	101	— 86	— 73	-161
1150	15	- 16	47	- 25	49	112	-164	41	-276
1200	— <u>38</u>	— 33	109	- 4	- 32	92	-196	205	-339
1250	— 75	- 25	112	35	— 93	62	-162	337	-338
1300	-104	— 37	70	69	-102	5	— 31	423	-27 I
135° 140°	—II6 — 21	- 40	5	98	- 70	-107	117	431	-224
1450	- 31 99	14	— 65 —175	47 — 68	- 42	-258	257	425	-180
1500	286	242	-175 -299	-130	-74 -163	-302 -250	387 459	374 308	- 79 61
			-		ALLS TO THE REST		709	300	

XII c. Differenzen zwischen den beobachteten und den berechneten Werten der Koeffizienten m und M.

(BeobBer.)												
и	m_0	m_1	M_1	m_2	M_2	m_3	M_3	m_4	M_4			
300	-166	557	465	- 46	573	— 51	-964	-1043	-337			
35°	214	-114	- 60	125	45	-311	—535	— 581	— 34			
400	161	-418	-493	-128	- 314	-280	- 30	- 137	257			
45°	- 34	-375	-411	-133	— 142	- 48	437	118	— <u>32</u>			
50°	-271	— 53	117	55	- 99	342	136	383	- 18			
55°	-101	121	420	133	- 44	— 39	383	603	160			
600	174	442	301	6	28	- 99	132	426	73			
65°	41	223	- 10	47	- 27	88	-159	60	-108			
700	35	- 71	-186	90	86	312	-104	- 270	-105			
75°	16	-228	-255	- 78	69	198	2	- 275	— 59			
800	7	— II	- 39	— 35	88	- 14	48	- 375	19			
85°	- 18	97	141	- 81	- 60	-211	64	— 289	13			
900	- 72	— 2 I	192	— 93	72	-289	-117	- 34	37			
95°	— 33	- 129	31	-154	146	-156	-268	99	9			
1000	88	-237	- 26	- 8	- 93	— 31	-171	101	— 22			
1050	73		-229	265	— 97	110	- 34	220	76			
1100	- 76	190	-315	276	1	34	161	240	- 29			
1150	- 69	334	32	115	- 131	-128	254	386	-100			
1200	— 60	360	196	-133	- 203	86	191	186	35			
1250	127	— 29	587	-280	- 259	460	141	- 126	193			
1300	210	-298	464	-256	- 175	519	222	- 488	72			
1350	-122	-22I	-580	80	885	-185	-163	— 55	-228			
1400	-257	-122	-864	146	1078	-339	-627	- 180	12			
1450	. 189	-263	— 31	- 65	- 114	-275	-336	- 508	— I			
1500	— 5	511	648	210	-1489	—586	324	- 514	-304			

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

XIV a. Abweichungen der berechneten Werte der Komponenten X von den beobachteten.

						$\Delta'X$						
u i	2 00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
30°	51	- 3	71	- 31	20	— 81	54	— 72	95	-346	255	-155
40°	268	-121	— 34	121	-103		-145	119	15	- 73		-293
50°	512	59	162		-315		-642	37		-206		— 56
60°	333	-311				178		143		-171		-387
700	142		-108	50				— I2		-156		-302
800	-183	153	-255	STORE STREET LINE	— 53	- 49					-467	133
900	-127	— I	96	- 30		-286		-130	2		-744	162
1000	-148	69		-102		-127		— 39			-448	
1100	- 260	145		249		- 43	120			— 19		335 80
1200	— 86	35	PER SECTION OF THE PERSON OF T	- 88		-154		— 33		-127		
1300	— II	- 44		-284		-241	41	- 14		-182	64	
1400	30	— 73		-116		-152		— 63 — IIA		-219 -225		32
1500	16	nede o	97	-225	_ 19	— 38	00	-114	114	-235	106	12
					hay :	$\Delta''X$						9
u 1	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	300°	3300
30°	— 99	123	437	553	516 -	-413 -	-1125	-412	-108	-625	-335	60
400	146	26 -	-116 -	-174	229	342 -	- 302	327	513	-178	— 68	59
50°	208	10 -	-430 -	-407	256	237 -	- 342	2	487	29	-287	21
600	-170	14 -	-125	85	201	20	98	24	-II2	215	150	-316
700	-487 -	— 76	243	112 -	-190 -	-153	225	82	-400	-158	189	-227
80°	442	167 -	-128	- 63 -	- 60 -	-148 -	- 34	79	167	107	— 87	158
900	263	126 -	- 15	- 10	195	83 -	- 211	— 68	58	-134		TO THE PERSON NAMED IN COLUMN
		-258	176	316 -		— 53 —	- 343	- 95	155	68	— 37	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
	-235	105		-170	18	512	207	- 51	307		— 53	62
1200	154		- 90 -			— I2			-173	-212		
1300	212		-251	264		-246			380	76		-457
	- 76		-375	575	A STREET OF STREET STREET	-189 -	The second secon		-400	167	324	-416
1500	-459 -	-172 -	-453 -	- 268 -	-241 -	-859 -	- 263	729	544	554	554	-302
						ΔX						
24 2	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
300	- 48	120	508	522	536 -	-494 -		-484		-97 I	- 80	- 95
400	414 -			53	126	465 -		446	•	-251		-234
500	720			-398 -		280 -	THE PERSON NAMED IN	39		-177		- 35
600		-297		- 73		198 -		Name and Additional Property of the Contract o	— 58	44		-703
700		-158	135	162 -		- 61	112			-314		-529
800	259	320 -		104 -		-197	40	43	138		-554	291
900	136	125		- 40	312 -		113	-198	NAME OF TAXABLE PARTY.		-77I	429
0.00		-189	226	214		- 180 -	THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN 2	-134			-485	
	- 495	250		-419	182	469	327	- 50		- 21		397
1200	68			-556 -		-166	324		-161	339		28
1300	201	294 -		- 20	594 -		109			-106		-465
	- 46 -	- 51 -			1047 -		37			- 52	A STATE OF THE STA	-384
1500	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	-172 -				-897 -		615		PHOTO		-290

¹⁾ Diese Abweichungen sind ebenso wie diejenigen in den vorhergehenden Tabellen im Sinne von (Beobachtung-Rechnung) gebildet.
Tabelle XIII steht zwischen VII und VIII, S. 56.

XIV b. Abweichungen der berechneten Werte der Komponente Y von den beobachteten.

						$\Delta'Y$							
u λ	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	
300	41	17	III	— 73	238	-193	155 -	-108	226 -	-346	— 93	29	
40° -	-113	146	-117	10	277	-170	269 -	-169		-182	44	60	
50° -	-163	267	-262	300	42	— 8 I		-299		-296	20	18	
	- 97	196	-352	0,1	-12I	-447		-387		-513	284 -		SK SS
700	110	144	-305	207	-169	- 79		-455		-487	461 -		
80°	210	192	-191		-152	42		-402		-374		-623	
900	180		-175		— 93	27		-474	-00	- 24		-380	
1000	28		-107		-143	98		-223	194	100		-130	
	-114	— 16	117		- 33		-149	52	— 20 108	71	3		
1200	, ,	-184		-162	49		—14I		—108 —220	31		- 65 - 57	
1300		-219		-117	152		—156 —165		-230 -244	0		- 57 1	
1400		-139	153	71	80		—165 50		-244 -110		- 40 -250	4 24	
1500	35	-170	315	-440	335	-233	50	01	110	249	230	-+	
$\Delta^{\prime\prime\prime} Y$													
ι λ	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	
30°	403	-460	33	259	-464	- 30	107	-751	-425	— 17	-236	417	
400		-797	124			-133		-290	69	231	-631	260	
50°	496	-798	305	759	-712	2	498	-560	291		-590	314	
60°	495	-427	33	522	-289	22	301	-329	307		—577	20	
70°	122	33	-126	2	•		— 52	38				— 31	
	-349	264	-147	-303	276	-120	AND THE RESIDENCE		-335			- 94	
	-380		—117	-412			-166			-214		-196	
	-152	338		-22I	149		-160	269	150	85		-102	
1100	57	- 45	256	112	— 23		-137	156			-191	221	
1200		-634		THE RESERVE OF STREET		66		-294		-134	-607	292	
1300			-167		-412	78	420		-241		-581	6	
1400		-176	61		-708	185			—356		— 65 1021		
1500	456	498	115	- 34	-239	255	4/2	—541	-109	1402	1021	56	
						ΔY							
μ λ	00	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	
300	444	-443	22	186	-226	-223	262	-859	-199	-363	-329	446	
400		651	7	601	-513	-303	917	-459	168	49	-587	320	
500	333	-531	43	1059	-670	— 83	869 -	-859	506	279	-570	332	
600	398	-231	-319	916	-410	-425	620 -	-716	754	— 51		-123	
700	232		-431	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	- 46	— 81	294	-417	590	-527		-666	
800 -	-139	456	-338	-108	124	- 78		-146		—725		-717	
900 -	-200	541	-292	-237		13	53	CONTRACTOR STORY				—576	
	-124		— 88	— 93	6		-110	46	344	191		-232	
	— 57	— 6 ₁	373		— 56				480		-194	124	
1200	-	-818		314		-	— 37			-103			
1300	PARTY DESCRIPTION OF THE PARTY	-851				180			-47 I		-672	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	
1400		-315	214	- 46		156		0,,,	600		-105		
1500	491	328	430	-474	90	22	522	—400	-219	1731	771	80	

Schneller, als ich hoffen konnte, hat sich mir kurz vor dem Abschlusse des Druckes der vorliegenden Arbeit die Gelegenheit zur ausführlichen Veröffentlichung der Rechnung und der Resultate geboten. Herr Geh. R. Neumayer hat mich zu erneutem Danke verpflichtet, indem er den Abdruck

 ${f XIV}$ c. Abweichungen der berechneten Werte der Komponente Z von den beobachteten.

						ΔZ						
24	2 00	3000	600	900	1200	1500	1800	2100	0002400	2700	3000	3300
300	144	- 79	120 -	- 197	29	-531	416	-356	1016	-3045	1679	-795
400	00 441	-688	0,	- 663	408	567	176	01 40		282	40	-554
50°	80			-1071	127	1137	420		-809	144	183	-493
600		-247		- 538	459	-197	116				- 37 ²	-545
700	348	277	34 -	, ,	469	-456 528	394				-712 -1220	578 730
800		382	144 -		821	-528 -815	607		—356 —141		- 810	693
900	-156 73	216	182 -	- 582 - 406	660	-821	698	-45I	224		- 149	80
1100	-699		—146	29	174		74	II	11 42		- 131	296
1200	-628		-494	413	- 54	13	643	-359			- 5	244
1300	79		-532	513	- 44	502	59	-259		- 354	558	-232
1400	- 95	0	- 685	800	-492		-105	-342	480	125	778	-334
1500	604	- 18	-380	216	-838	1532	-513	184	259	+ 493	788	-780
						$\Delta^{"}Z$						
24	2 00	300	600	900	1200	1500	180	0 21	00 2400	2700	3000	3300
30°	7-749	288	1899	266	— 336	-1086	-176	78	6 434	-2592	-483	1342
400	-802	-522	—557	-311	290	300	59-	1 75	5 155	615	1286	129
50°	456	-388	-827	38	50	- 93	- I 2	2 - 68	5 - 293	76	-890	-574
600	949	717	500	763	— 62	- 224	26;	THE RESERVE OF THE PARTY OF	4 - 662	425	56	— 23
700	16. 96		-218	-407	146		- 386				-227	367
800	-428	289		-420	110	122	- 378				195	46
900	-509		467	296		- 199	SOSII			— 322 	73	-193
1100	- 87	100	-130	342	168	154	210					112
1200	439	236	-520 - 29	264	- 694 195	- 195 - 97			60 - 96 $60 - 556$		— 20 44	127 — 51
1300	ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	433	102	220	1866		- 75			-264		-297
1400		-315	213	0	-2189		170				-137	- 85
1500	-384		524	-405	893	2115			6 -2282		1454	1704
	20 11	0	6-0	0.00	0	ΔZ	-0-0	2.0	00	2420	2000	0
	λ ο0	300	600	900	1200	1500	1800	210		2700	3000	3300
	-605 -361		2019	69 -			-1345	430		—5637 807	1196	547 — 425
500			131 -		698 -	- 267 44	770	795	-346 -1102	897	1326 - - 707 -	
600		470	876	225		- 42I	379		-843			- 568
32-747-54	- 252		-184 -			- 360	8	434			- 939	945
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-1193	671	390 -			- 406	98	202			-1025	776
	- 665	65				-1014			-564		— 737	500
	- 14 -	- 239	4 -	- 64	828 -	— 667		- 128	(Internal Control of the Control of		- 111	192
1100		542 -	-666 -	- 559 -	- 520 -	- 342	142	— 261	- 54	440 -	- 157	423
1200			-523	677		- 94			— I 37	109	39	193
1300			-430		1822			- 218		— . 618		— 529
1400			-472 -		-2681 -			1673			641	- 419
1,500	220 -	- 123	144 —	- 189	55	3047 -	747	-2102	-2023	-1546	2242	924

derselben in dem nächstens erscheinenden XVIII. Bande von "Aus dem Archiv der deutschen Seewarte" zugesagt und ausserdem durch eine nochmalige Unterstützung die dazu nötige Beschleunigung der noch durchzuführenden Berechnungen ermöglicht hat.

ACCOUNT OF THE REAL PROPERTY AND ASSESSED. IN ACCOUNT. IN ACCOUNT.

3m Phys. sp. 2192

Herr

erhalten anbei als Recensionsbeleg über:

einen Ausschnitt aus No. 42 des

Literarischen Centralblattes für Deutschland.

Mit der Bitte um fernere Einsendung von zur Besprechung geeigneten Werken

Astronomie. Mathematik.

Schmidt, Adolf, Mittheilungen über eine neue Berechnung des erdmagnetischen Potentials. München, 1895. Franz in Comm. (66 S. 4.) M 2.

Aus d. Abh. d. kgl. bayer. Akademie d. Wiss. II. Cl. XIX Bd. 1. Abthlg.

Die bisherigen durch die Arbeiten von Gauß eingeleiteten Versuche, die Aeußerungen der erdmagnetischen Kraft durch einen analytischen Ausdruck darzustellen, weisen, tropdem das Beobachtungsmaterial stetig an Umfang und Verläßlichkeit gewonnen hat, keine in entsprechendem Maße wachsende Unnäherung an die Wirklichkeit auf. Die Differenzen zwischen den beobachteten und berechneten Werthen sind selbst bei der neuesten Berechnung des erdmagnetischen Potentials durch Neumayer und Petersen nicht wesentlich kleiner als bei der ältesten, von Gauß selbst ausgeführten. Die Ursache kann nicht mehr als eine Folge der Mangelhaftigkeit der empirischen Grundlage angesehen, muß vielmehr in einer Unvollkommenheit der Theorie gesucht werden. Der Verf. versucht eine Verbesserung der Theorie einerseits in einer Weiterführung der mathematischen Reihenentwickelungen und in der Berücksich= tigung der Abplattung des Erdkörpers, andererseits verwirft er die bisher festgehaltenen Voraussetzungen, daß die erdmagnetische Kraft ein Potential besitzt, und daß dieses seinen Ursprung ausschließlich im Erdinnern hat. Hieraus ergiebt sich ihm die Aufgabe, eine von jeder physikalischen Hypothese freie, analy= tische Darstellung von der Vertheilung der erdmagnetischen Kraft auf der Erdoberfläche zu geben, eine Darstellung, deren Genauigkeit beliebig weit getrieben werden kann, da sie allein von der Sicherheit der Beobachtungsdaten und von der Ausdehnung der benutten Reihen abhängt. Die complicierten numerischen Berechnungen, die Prof. Schmidt selbst liefert, sind jo angelegt, daß spätere Wiederholungen mit verbesserten empirischen Grundlagen nach Möglichkeit erleichtert sind. Dies wird dadurch erreicht, daß alle Operationen zunächst möglichst allgemein durchgeführt und die Beobachtungsdaten erst möglichst spät eingesetzt werden, woraus der weitere Vortheil entsteht, daß die abgeleiteten allgemeinen Lösungen auch zur Behandlung anderer geophysikalischer Probleme herangezogen werden können. In der vorliegenden Abhandlung werden die Rechnungsgrundlagen und die wichtigsten Resultate mitgetheilt, deren empirische Grundlage dieselbe ist, auf der die Potentialberechnung von Neumener und Petersen beruht.

Zeitschrift für mathemat. u. naturwissenschaftl. Unterricht. Hreg. von J. C. B. Hoffmann. 27. Jahrg. 7. Heft.

Inh.: Jos. Mayer, über die vier Grundrechnungsarten mit periodischen Decimalbrüchen. — Rud. Schönherr, Notiz über die Aufslösung einiger eingekleideter Aufgaben in Barden's Aufgabensammlung. — Neumann, zur Zerlegung ungerader Zahlen in Factoren mit Beziehung auf den Artikel von Wertheim in heft 4, S. 206. — Pädagogische Zeitung.